

Revista Andaluza de

Cirugía Bucal

Año 2020 / N° 9

- **NUEVOS PARADIGMAS: OCLUSIÓN Y POSTURA**
- **EXPOSICIÓN QUIRÚRGICA ABIERTA VS. CERRADA EN RESCATE DE CANINOS IMPACTADOS. A PROPÓSITO DE UN CASO BILATERAL EN PALATINO**
- **QUISTE RESIDUAL MANDIBULAR: ENUCLEACIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO**



Asociación
Andaluza
de Cirugía Bucal

Revista Andaluza de
Cirugía Bucal

DIRECTORES:

José Luis Gutiérrez Pérez
Daniel Torres Lagares

EDITORES:

Aida Gutiérrez Corrales
Ignacio Fernández Asián

COMITÉ EDITORIAL:


Rogelio Álvarez Marín
Iñigo Fernández - Figares Conde
M^ª Ángeles Serrera Figallo



Editada en Sevilla, por la Unidad de Docencia,
Investigación y Transferencia en Cirugía Bucal de Sevilla (UDIT-CBS).
Maquetación y diseño: Talento Consultores de Comunicación
ISSN: 2530 - 4135

Sumario

- Editorial 4
- NUEVOS PARADIGMAS: OCLUSIÓN Y POSTURA 5 - 21
- EXPOSICIÓN QUIRÚRGICA ABIERTA VS. CERRADA EN RESCATE DE CANINOS
IMPACTADOS. A PROPÓSITO DE UN CASO BILATERAL EN PALATINO 22 - 27
- QUISTE RESIDUAL MANDIBULAR: ENUCLEACIÓN.
A PROPÓSITO DE UN CASO 28 - 32
- Noticias 33 - 38
- Normas de publicación 40 - 41



2020: La Cirugía Bucal andaluza sigue avanzando

La Asociación Andaluza de Cirugía Bucal (AACIB) es una asociación que tiene como uno de sus objetivos el fomento del intercambio de conocimientos para contribuir a la elevación del nivel científico de la Cirugía Bucal en Andalucía. Por ello, en nombre del comité organizador, tengo el privilegio y el orgullo de invitarles a participar en el III Congreso Anual de la AACIB que se celebrará en el Precise Resort El Rompido (Huelva) el 27 de junio de 2020.

En el marco de las actividades que desarrolla la AACIB, tiene entre sus fechas del calendario como máximo exponente la celebración de su congreso anual. Estamos dedicando mucho esfuerzo e ilusión para que sea un día donde se aúnan conocimientos, se compartan vivencias y sea un lugar de encuentro con amistades en el que aparte de la actividad científica, se disfrute de la programación lúdica en un escenario donde el tiempo y la situación geográfica de El Rompido son únicos.

Cabe destacar que este año, por primera vez, se organizará de forma simultánea con la Reunión de Verano de la Sociedad Española de Odontostomatología para Pacientes con Necesidades Especiales (SEOENE), siendo un marco inmejorable para el fomento del intercambio de conocimientos y la colaboración con otras sociedades odontológicas.

Será un congreso que contará con la participación de profesionales referentes a nivel nacional e internacional, que abordarán diferentes bloques temáticos compartiendo sus conocimientos en diversos aspectos relacionados con la cirugía bucal, tales como la regeneración ósea, el flujo digital, el manejo de tejidos duros y blando así como los avances y alternativas en implantología.

Para ampliar la información pueden consultar en <https://www.aacib.es> o bien, a través de AACIB en las redes sociales de Facebook y Twitter.

También os animamos a la participación en los diferentes cursos que realiza la AACIB en las provincias andaluzas, con la colaboración de los Colegios Oficiales de Dentistas, del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas y de las Universidades de Granada y Sevilla, así como a ser partícipes en la Asociación, siendo miembros activos tanto de las actividades científicas como en las comunicaciones, talleres... con la idea de poder generar un intercambio enriquecedor de conocimientos y una puesta al día en los avances relacionados con la Cirugía Bucal.

Agradecer que dicha puesta al día es posible gracias a la ayuda de un equipo humano que desarrolla un espléndido trabajo y a las administraciones y casas comerciales que hacen que se puedan organizar dichos eventos.

Esperamos contar con una gran participación para hacer del III Congreso AACIB – EL ROMPIDO 2020 una cita inolvidable.

Dr. Eloy Cano Díaz
Presidente del III Congreso AACIB
El Rompido, Huelva 2020

NUEVOS PARADIGMAS: OCLUSIÓN Y POSTURA.

Ramos Martínez MC¹

¹UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia.

RESUMEN

La armonía y el equilibrio entre la forma y la función de los órganos vitales son esenciales para el mantenimiento de una condición fisiológica adecuada. Este concepto se aplica a la relación entre el sistema estomatognático y el cuerpo ya que se encuentran íntimamente relacionados por medio de estructuras musculoesqueléticas y del sistema nervioso, existiendo una correlación biomecánica y neurofisiológica entre ambos. Esta correlación viene a explicar cómo el tipo y modificaciones de la oclusión dental tienen repercusión a nivel corporal, al mismo tiempo que el equilibrio postural influye en la oclusión. Toda perturbación del equilibrio muscular de la mandíbula entraña una perturbación sobre las cadenas musculares estas juegan un papel predominante sobre la postura del individuo y forman una amalgama fisiológica con la oclusión dentaria. Un desequilibrio musculoesquelético en cualquier parte del sistema se reflejará en la totalidad del sistema. La relación de las maloclusiones con la postura de la cabeza es un factor de relevancia clínica y debe ser considerada en los procedimientos de terapia oclusal, además de incluir en el estudio clínico del paciente las posiciones espaciales de la cabeza, el cuello, la columna vertebral y la postura corporal, para no sólo realizar un tratamiento oclusal, sino un tratamiento orientado a restituir el equilibrio postural de la unidad cabeza y cuello. La boca debe ser entendida como una unidad estabilizadora del mecanismo esquelético, siendo imprescindible extrapolar sus límites para comprender su relación como un todo.

PALABRAS CLAVE: Postura, Posturología, Oclusión, Esquema Postural, Propiocepción, Cadena muscular, Mordida Cruzada.

INTRODUCCIÓN

La relación biomecánica entre cabeza, columna cervical y sistema estomatognático siempre ha generado un amplio debate científico, particularmente, la posición de la mandíbula en estado de reposo, porque se han observado problemas posturales en más de 90% de los casos de sujetos con algún tipo de maloclusión, lo que ha provocado un interés creciente sobre este tema en la práctica diaria, la profesión odontológica ha prestado poca atención a la evaluación de la estabilidad ortostática del cráneo sobre la columna cervical, dejando de lado la verdadera etiología de muchos de los problemas que nos encontramos en la cavidad oral ⁽¹⁾.

La armonía y el equilibrio entre la forma y la función de los órganos vitales son necesario para el mantenimiento de una condición fisiológica adecuada. Dolores cervicales recurrentes, prótesis que se parten con frecuencia, dolores de cabeza, dolor de espalda, trastornos del equilibrio, dolor de cuello y hombro, ortodancias que recidivan, hay un gran porcentaje de pacientes disfuncionales que presentan un cuadro asimétrico de síntomas y de signos clínicos: tensiones musculares, dolores, ruidos articulares, lesiones y/o pérdida de elementos dentarios más evidentes de un lado respecto al otro. El resultado de estas lesiones asimétricas es la torsión mandibular.

¿Alguna vez nos hemos preguntado si el problema era el enfoque del odontólogo, nuestro enfoque? ¿Nos hemos parado a pensar si detrás de ese fracaso había algo que pasamos por alto? ¿Por qué ocurre esto?

- La boca del paciente no fue evaluada en su contexto postural.

Existe un vínculo entre los movimientos de la región cervical y la ATM, ya que en la apertura mandibular se produce una extensión del raquis cervical alto (Atlas y Axis) y durante el cierre se produce una flexión cervical ⁽²⁾. De la misma forma se puede observar que la posición de la cabeza afecta tanto a la dinámica articular de la ATM, como condiciona la posición mandibular, la alteración de la cual desequilibra el sistema estomatognático pudiendo esto influir en la erupción final de la dentición y de ese modo en la oclusión. La relación biomecánica craneocervical-mandibular, región hioidea y vías aéreas forman una unidad anatómofuncional indisoluble y como tal debe ser estudiada ⁽³⁾.

- Esta unidad está intrínsecamente relacionada con toda la postura ⁽⁴⁾.

En la interrelación entre el sistema estomatognático y la postural corporal; se resalta la influencia de las funciones orofaciales sobre el crecimiento craneofacial y el equilibrio postural, ya que dichas funciones necesitan la colocación de la cabeza de manera estable tanto para la masticación, como para mantener la vía aérea abierta para respirar y para deglutir, permitiendo que esas funciones sean metabólicamente eficientes.

Del mismo modo entre los factores que condicionan de manera determinante el funcionamiento normal o anormal del sistema de equilibrio, se encuentra sin

ninguna duda la oclusión. Es evidente que la oclusión dental, al condicionar la relación craneomandibular en el momento de la deglución aproximadamente 1500 veces al día, influye también en la relación mandíbula - hueso hioides - cintura escapular ⁽⁶⁾. En otras palabras: la oclusión interviene de manera determinante en el complejo muscular de flexión de la cabeza en relación con el tronco ⁽⁷⁾. El odontólogo como profesional de la salud tiene la responsabilidad de conocer la relación entre ambas disciplinas y prever las posibles consecuencias. (Figura 1)

• Postura: Equilibrio Vs Desequilibrio




Figura 1. Para que las funciones orales se desarrollen correctamente, es fundamental que la cabeza tenga una postura correcta y estable.

El término "postura" fue utilizado por Rede (1626-1698) por primera vez en su Tratado de Anatomía Humana, definiéndola como una actitud habitual del cuerpo o de ciertas partes de éste. Con posterioridad, autores como Solow, Kendall, Buzzi, Guidetti, Boccardi, Bricot, Scoppa, Zavarella entre otros, la han definido como la posición del cuerpo en el espacio y la relación espacial entre segmentos esqueléticos, necesarios para mantener el equilibrio en condiciones estáticas y/o dinámicas ⁽¹⁾.

Una postura adecuada es aquella capaz tanto de mantener la alineación de los segmentos corporales con un mínimo gasto de energía posible como de lograr el máximo de eficacia mecánica del sistema neurocervical. Si la postura no es correcta, los músculos no trabajan simultánea y coordinadamente. Esto tendrá un efecto negativo en el sistema óseo, en la morfología craneofacial y en la postura de la cabeza ⁽⁸⁾. Podemos definir la postura de manera muy simple como nuestra capacidad para mantener el equilibrio con la máxima comodidad y con el mínimo gasto de energía, interactuando con el entorno que nos rodea. La postura responde al principio de equilibrio, econo-

mía y confort (ausencia de fatiga muscular, de tensión residual, de dolor ó sensación de incomodidad corporal). (Figura 2)

El sistema de equilibrio del hombre es complejo, ya que presenta una base de sustentación pequeña (planta de los pies) y un centro de gravedad muy alto en relación a esa base de sustentación, para mantener su posición bípeda, lucha contra esa fuerza de la gravedad para conseguir el equilibrio estático y dinámico (Figura 3). Esta lucha, se realiza a través de reflejos que se integran a nivel subcortical, sin llegar a nivel de la conciencia ⁽⁹⁾. El hombre busca siempre su equilibrio; y al hacerlo manifiesta esta propiedad de los cuerpos que tienden a volver a su posición de equilibrio cuando se les aparta de ella y que se llama estabilidad ⁽¹⁰⁾.




Figura 2. Máxima eficacia - Mínimo gasto energético.

El sistema nervioso, debe ser informado de forma

continua e inmediata de la posición corporal, tono muscular, dirección, amplitud del movimiento, etc. esta información llega a nivel subcortical (cerebelo, tronco del encéfalo, núcleos de la base) o cortical, dando origen a respuestas involuntarias o voluntarias que son responsables de ajustes posturales que se realizan para conseguir el equilibrio. Estos ajustes consisten en oscilaciones mínimas por cambios compensatorios de otras partes del cuerpo y tienden a colocar la vertical que pasa por el centro de gravedad (CDG) dentro de la superficie del polígono de sustentación con una distribución de cargas equilibradas ⁽¹¹⁾.

De estos ajustes es responsables el sistema tónico



Figura 3. La estabilidad es el fin terapéutico de los pacientes. Es la diferencia entre la patología aguda o la crónica.

postural (STP) o Sistema Postural Fino (SPF) ⁽¹⁰⁾. El hombre mira hacia arriba para tener un mejor dominio del territorio, pero paga el precio de la lucha contra la fuerza de la gravedad y usa los dos vértices, cabeza y pies para minimizar el costo de energía del esfuerzo, necesitó organizar el control automático mediante la evolución del sistema tónico postural (STP) ⁽¹²⁾. (Figura 4)

El cuerpo humano es tan noble y resistente que se va adaptando poco a poco, buscando un equilibrio precario. En realidad, el STP es un sistema muy complejo formado por una serie de subsistemas, que llamaremos "receptores" (como el ojo, el oído, la boca, los pies, la piel y pequeños corpúsculos ubicados dentro del músculos, articulaciones, vísceras) que recopilan información del exterior y del interior de nuestro cuerpo (exteroceptores y propioceptores) y la envían a una especie de computadora central (sistema nervioso), que a su vez procesa los programas y modula a nivel córtico-espinal y a través del sistema de reflejos néuro-sensitivo motores, la coordinación de los músculos posturales, que llamaremos sistema efector.




Figura 4. Evolución de la postura de los homínidos.

Esta respuesta motora nos permite mantener el equilibrio en ese momento determinado, modificando el estado de las cadenas musculares según estemos de pie o sentado, caminando o corriendo, en última instancia, mientras lucha contra un enemigo invisible pero muy poderoso: la fuerza de la gravedad, ya que estos receptores captan la menor variación de nuestro cuerpo creando engramas neuronales de movimiento que permiten mantenerla verticalidad. Si uno de estos receptores, comenzara a funcionar mal, todos los demás sufrirían y nuestro cuerpo tendrá que buscar sistemas de compensación para adaptarse a la nueva situación. Mientras estas adaptaciones no superen el umbral de resistencia al estrés individual, el sistema puede compensar bien incluso pueden aparecer ligeras alteraciones periódicas y ocasionales.

Los receptores posturales son llamados captosres posturales son los responsables de transmitir al cerebro esa referencia de la verticalidad necesaria para mantener la posición erecta ⁽¹³⁾. En relación con la posturología, se reconocen: el oído interno, los ojos y la superficie cutánea plantar, y el aparato estomatognático que es considerado también como un receptor sensorial ⁽¹⁴⁾. Las articulaciones temporomandibulares (ATM) son unas subunidades del STP que constituyen el enlace entre las cadenas fasciales anteriores y posteriores, se consideran un sistema de protección importante de la columna vertebral ya que amortigua los desequilibrios tanto a nivel de cadenas ascendentes (problema podal), como de las cadenas descendentes (problema craneal: Ojos, oído...). La remodelación de las superficies articulares absorbería las tensiones anormales permitiendo la adaptación y en último lugar esas tensiones se transmiten a los dientes. Cuando los dientes fallan al cumplir esa función puede aparecer el desequilibrio a nivel de las relaciones funcionales y anatómicas de la columna vertebral ⁽¹³⁾. (Figura 5)

El aparato estomatognático por tanto interviene en la regulación de la postura corporal, recibiendo información propioceptiva y exteroceptiva de los músculos, los tendones, la lengua, el ligamento periodontal, su-




Figura 5. Receptores y su relación con el SNC y los músculos.

perfiles oclusales y la articulación t mporo-mandibular e informa al SNC de forma extremadamente fina acerca de la estabilidad y la din mica de la mand bula. Este contrasta-referencia-memoriza esa informaci n a trav s de la colocaci n de la cabeza de manera estable siendo esto necesario para realizar sus funciones (tanto para la masticaci n, como para mantener la v a a rea abierta para respirar y para deglutir) para que estas sean metab licamente eficientes, tanto para nuestra supervivencia, como tambi n en situaciones en las que el ser humano tiene que defenderse ante las agresiones del medio (huida, lucha, etc.) o para lograr con destreza el alcanzar objetivos complejos en actividades f sico-deportivas. En estas situaciones, la mand bula debe estar finamente estabilizada, sin interferencias en la oclusi n, para que el SNC reciba informaci n necesaria para afrontar con precisi n acciones corporales complejas ⁽¹⁴⁾. (Figura 6)




Figura 6. Constituyen los sistemas de amortiguaci n de las tensiones mec nicas del sistema m sculo-ligamentoso con el objetivo principal de proteger la columna vertebral.

En una maloclusi n dental, la asimetr a mandibular funcional es detectada por los receptores posturales, de modo que se modifica el patr n habitual y se genera otro configurado en el SNC, con compensaciones musculares a diferentes niveles, hay una reprogramaci n postural. Inicialmente, el cambio es funcional, pero, de mantenerse, puede ser definitivo por el desarrollo  seo posterior, todo lo funcional con el tiempo se convierte en estructural ⁽¹⁾. En definitiva, la eficacia del control postural va a estar relacionada con la capacidad de percibir correctamente el entorno a trav s de los sistemas sensoriales perif ricos: propioceptivo, visual y vestibular.

En caso de alteraciones del sistema estomatogn tico ¿existe correlaci n con el equilibrio postural? ⁽¹⁷⁾.

• Oclusi n y Postura

La importancia de la correlaci n ocluso postural fue planteada por el Dr. Jean Pierre Meersseman, presidente de la Academia Italiana de Kinesiolog a Aplicada.  l impuls  una nueva filosof a diagn stica y desarroll  las bases para un nuevo enfoque terap utico. Este enfoque plantea el tratamiento interdisciplinario de los problemas posturales con la odontolog a como condici n para el tratamiento de aquellos casos en los que el restablecimiento del equilibrio postural requiera una intervenci n global sobre el cuerpo ⁽¹⁸⁾.

El Dr. Javier Bascar n plantea que fueron los postur logos quienes se percataron del posible papel que podr a desempe ar la boca en el mantenimiento y la perturbaci n de la postura ⁽¹⁹⁾. (Figura 7)

En este momento comienza la Odontoposturolog a que es definida como la parte de la Odontolog a que se encarga del estudio de la relaci n entre el aparato estomatogn tico y el equilibrio ortost tico del ser humano. Su finalidad es prevenir y mantener una postura normal o sana y tratar el S ndrome de Deficiencia Postural descendente de origen estomatogn tico.

Pero ¿por qu  considerar este binomio entre postura corporal y maloclusi n como una condici n tan estrechamente relacionada? La boca influye en la postura, ya que funciona como un sistema adaptativo en muchas ocasiones de trastornos posturales, pero en algunos casos es un elemento perturbador de la informaci n postural primaria, que debe ser corregido para que la reprogramaci n de otros captos sea eficaz.

• La evidencia sigue acumulando que las alteraciones no tratadas del sistema estomatogn tico proporcionan un «factor irritativo» (trastornos temporomandibulares y maloclusi n), siendo capaz de iniciar una reacci n de contracci n-relajaci n en cadena, de un m sculo o grupo de m sculos rela-




Figura 7. La información sensorial orofacial específicamente la recogida por el periodonto modifica la actividad de los músculos del cuello y regula y mantiene la postura del cuerpo ⁽¹⁵⁾.

cionados con ese factor.

- Esta reacción se extiende al resto de la musculatura corporal desde la cabeza hasta los pies (teoría de las cadenas musculares) puede afectar el centro de presión del pie (CP) y la estabilidad de la marcha del mismo modo que se puede afectar a la convergencia ocular, siendo ambos receptores posturales de primer orden que participan en el ajuste postural estático y dinámico ^(20, 21).

- Tenemos entonces por una parte la oclusión, y por la otra, el apoyo podal. Estos factores periféricos desarrollan dos funciones importantísimas: la deglución y la deambulación, que implican de diferentes maneras a todas las estructuras esqueléticas y musculares interpuestas entre ambos extremos y por consiguiente la columna vertebral, así como, directa o indirectamente, al sistema nervioso central y periférico. La deglución, en particular, es una función vital, de la cual destacamos su importancia fisiológica.

Por el contrario, los cambios en la postura del cuerpo pueden afectar la posición mandibular. Se estima que un 90% de la población tiene un desequilibrio postural, lo más frecuente es que la cabeza se sitúe por delante de los hombros. Si esta postura se mantiene demasiado tiempo influye en la posición del centro de gravedad y puede aparecer un cuadro patológico, en el cual se transmiten fuerzas compresivas y de palanca adicionales a la columna cervical y a los músculos masticatorios a nivel del sistema estomatognático que cambian la posición mandibular: la mandíbula ante esto busca y adopta nuevas posiciones ante la necesidad de funcionar ya que de su estabilidad dependen las funciones de masticación, deglución, fonación, respiración en situaciones de necesidad vital,

pero también en situaciones en las que el ser humano tiene que defenderse ante las agresiones del medio (huida, lucha, etc.) o para lograr con destreza el alcanzar objetivos complejos en actividades físico-deportivas.

La mandíbula debe estar finamente estabilizada, sin interferencias en la oclusión, para que el SNC reciba información necesaria para afrontar con precisión acciones corporales complejas.

- En estas situaciones, los contactos dentarios entre maxilar y mandíbula se ven afectados seriamente tanto a nivel de la estabilidad oclusal, como del espacio de inclusión fisiológico, dando lugar a inestabilidad oclusal y bruxismo.

- Además, se originan grandes alteraciones en los patrones musculares alterando la trayectoria de cierre mandibular y en las posiciones de las ATM (centricidad y dinámica) ⁽²²⁾.

Por lo tanto, una actitud postural incorrecta es considerada como factor etiológico de maloclusiones, ya que modifica de forma instantánea la relación entre los dos maxilares. (Figura 8)

La maloclusión dental no solo se puede relacionar con la posición de la mandíbula y del cráneo, si la mandíbula entra en desequilibrio, el cráneo va a tomar una posición anómala, pero a su vez, se produce una sobrecarga en la columna cervical y en un intento de adaptación se generan malposiciones a nivel dorsal y también con la columna cervical, las estructuras supra e infrahioides, los hombros, la columna torácica y lumbar, que simultáneamente funcionan como una unidad biomecánica ⁽²³⁾ dando lugar a posibles cambios a nivel de cintura pélvica y más comúnmente tor-

sión de la cintura biescapular, ya que ambos son subunidades de configuración espacial y constituyen (junto a la ATM) los sistemas de amortiguamiento de las tensiones mecánicas en flexión-extensión, flexión lateral, torsión, realizadas por el sistema músculo-ligamentoso, con el objetivo principal de proteger la columna vertebral ⁽¹³⁾.

Todas esas modificaciones posturales pueden llegar a generar una disminución de la irrigación de la arteria vertebral, provocando vértigos, cefaleas vasculares, visión borrosa, sintomatología dolorosa en el miembro superior, así como disminución de la fuerza muscular. Pudiendo revertir en la dificultad para respirar, cansancio, arritmias cardíacas, disfunciones gastrointestinales y trastornos en la marcha por la aparente diferencia de longitud de los miembros infe-




Figura 8. La odontoposturología se basa en el estudio de los diferentes captadores sensoriales y sensitivos que intervienen en la regulación de la postura, donde el sistema estomatognático tiene un papel evidente, permitiéndonos acercarnos a la aplicación de estas técnicas diagnósticas y terapéuticas.

riores. La maloclusión adquiere el significado de una respuesta adaptativa inteligente a un sistema biológico desestabilizador de fatiga, mientras que la terapia de una reprogramación postural se puede lograr con un tratamiento más funcional, con respeto a la fisiología individual siendo importante obtener una relación céntrica mandibular en equilibrio con el resto del cuerpo ⁽²⁴⁾.

Los TTM y las maloclusiones dentales a menudo son los espías, en un desequilibrio postural global que podemos definir como Síndrome De Disfunción Postural. Aunque la evidencia científica tiende a cuestionar la relación entre las enfermedades bucales y la postura, las últimas investigaciones sugieren que, en beneficio de los pacientes, ha llegado el momento de cambiar el enfoque y obtener una visión global sobre el tema.

¿Cómo podemos definir una buena oclusión? En nuestra profesión donde reinan la estética y la cosmética, a menudo confundimos una bella oclusión y una buena oclusión. El concepto de "oclusión ideal" hoy ha sido desplazado por el de "oclusión funcional",

lo que significa una condición en la que existe armonía entre los arcos dentales, correlacionada de tal manera que se desarrollen relaciones estáticas y dinámicas sin estímulos patógenos. para estructuras articulares y el sistema neuromuscular, en un contexto estético agradable, con respiración y deglución óptimas. Estado de ortofunción del sistema estomatognático

• Captor Oclusal

Es el conjunto del sistema masticatorio con sus componentes anatómicos y fisiológicos lo que debe ser considerado, en relación con la unidad CCMN, a través de la articulación occipito-atloidea se encuentra en equilibrio, la columna cervical, los maxilares, la musculatura y el hioides y todas las estructuras relacionadas. Interviene en la regulación del sistema tónico postural como un receptor, pero su papel es sobre todo perturbador a nivel mecánico (dientes y ATM), a nivel muscular y a nivel neurológico reflejo ⁽²⁵⁾.

Tres articulaciones: Dos ATMs (articulaciones guía que no admiten sobrecarga) y una articulación fuerte para el contacto de piezas dentarias. Este complejo triarticular, para que funcione correctamente precisa que todos los dientes reciban una carga equilibrada en cada momento y además en una dirección precisa. Todas las piezas dentarias deben estar en una posición funcional correcta. Así habrá una actividad de la musculatura de la boca equilibrada y dos ATMs no se sobrecargarán. Así se establece la relación boca y equilibrio postural, la esencia de la patología está en la situación de discrepancia entre la posición estructural y funcional de la mandíbula, que cuando excede el umbral de adaptabilidad del sistema origina signos de descompensación en estructuras adyacentes.

La ATM es uno de los importantes factores en la obtención del equilibrio, ya que ésta sirve de articulación guía para que el cuerpo adopte una buena postura.

Cuando se rompe el equilibrio dental por extracciones y/o maloclusiones, el cóndilo mandibular va a adquirir una posición distinta a la habitual dentro de la cavidad glenoidea, provocando una sobrecarga en ésta que conlleva a una asimetría facial. Para compensarlo se adoptan posiciones posturales incorrectas ⁽²⁶⁾. La alteración de la oclusión podría generar aferencias responsables de cambios de alineación postural. Existe normalidad morfológica de estructuras permitiendo el desarrollo de normalidad funcional. (Figuras 9, 10 y 11)

A nivel del SNC existe conexión entre el V y el III par craneal, el trigémino y el motor ocular común, sus núcleos están íntimamente ligados y cada alteración del uno afecta al otro. Cada cambio de posición en la ATM crea hipoconvergencia homolateral, los cambios




Figura 9. Pérdida de una correcta relación entre ambos sistemas CC y CM. El equilibrio entre la relación céntrica craneocervical y craneomandibular es fundamental.



Figura 10. Báscula contralateral escapular y pélvica. Báscula tampón protección raquídea. Limitación bilateral rotación cervical. Rotación heterolateral escapular y pélvica. Desordenes psíquicos frecuentes. Alteración de otros captadores posturales: relación boca-ojo; relación boca-pie.




Figura 11. Laterodesviaciones Hipoconvergencia homolateral ante o retro-posiciones- Hipoconvergencia bilateral.

de posición bilateral, provocan pérdida bilateral de la convergencia ⁽²⁷⁾.

La relación boca-pie puede afectar al centro de presión podálico y a la marcha ⁽²⁸⁾.

• Desequilibrios Posturales

Los trastornos a nivel del equilibrio postural fino se pueden clasificar en ascendentes y descendentes.

• En los desequilibrios ascendentes, el problema se inicia a nivel inferior y repercute en el tramo superior del STP. Entre estos se encuentran los relativos al apoyo plantar, retropié, miembros inferiores, pelvis, columna vertebral, hombros, miembros superiores y columna cervical.

• En los descendentes, el problema se ubica en el tramo cefálico y ocasionarán cambios posturales a los elementos inferiores. De esta forma, problemas en el órgano del equilibrio del oído interno, en la convergencia ocular, o en el sistema estomatognático, acarrearán desequilibrios en las estructuras inferiores del STP.

• El desequilibrio también puede ser mixto; cuenta con la presencia simultánea de síndromes ascendentes y descendentes.

• Desequilibrio postural descendente de causa estomatognática

Ante la presencia de una clase II ó III de Angle, se adoptan posturas que permiten compensar la retrusión o protrusión mandibular respectivamente, en busca de equilibrio postural.

• En la distoclusión, la mandíbula está en relación distal con respecto al maxilar, lo cual hace que, en busca de compensación, se adelante la posición cabeza y, por tanto, ésta se hiperextiende, repercutiendo sobre la ATM y la columna cervical y por ende en todo el resto de la columna vertebral, la persona se inclina anteriormente con un plano escapular anterior, Estas modificaciones suelen asociarse con problemas respiratorios de las vías altas, y la respiración oral empeora aún más el cuadro de clase II ⁽³⁰⁾.

• En la mesioclusión, la mandíbula al encontrarse en relación mesial al maxilar se tiende a ubicar la cabeza hacia atrás en una posición no fisiológica, lo cual afecta a la columna vertebral y a la postura general, la persona se inclina posteriormente con un plano escapular posterior ⁽³¹⁾. (Figura 12)

La mordida cruzada y la alteración relación transversal entre las arcadas, se originan interferencias en la oclusión estática y dinámica, que poco a poco ocasionan desviaciones funcionales, dentoalveolares y más




Figura 12. Cualquier desequilibrio mandíbulo–craneal en sentido antero–posterior tendrá una compensación en la postura vertical del cuerpo y viceversa.

tarde esqueléticas acarreado inclinaciones del plano oclusal. Para compensar esta situación se producen desviaciones faciales, cervicales y del resto del organismo hasta desencadenar cambios en el apoyo plantar. Según algunos autores y haciendo referencia a la mordida cruzada posterior unilateral izquierda (MCPUI), como consecuencia de la asimetría de la estimulación y de la contracción muscular, se produce una rotación mandibular izquierda, manifestándose como asimetría facial. Asimismo, tiene lugar una rotación y lateralización de la cabeza hacia el mismo lado, la elevación del hombro izquierdo, un descenso y un movimiento hacia atrás del derecho, una elevación de la cadera derecha, un descenso y rotación posterior de la izquierda, produciendo todo ello un alargamiento de la pierna izquierda con respecto a la derecha, así como la torsión de la columna vertebral. A nivel de miembros inferiores, se produce la extensión de la rodilla y flexión del tobillo con rotación interna del pie en el lado izquierdo, mientras que en el derecho el pie estará en rotación externa. Este estímulo mantenido en el tiempo durante el crecimiento no sólo produce

un desarrollo asimétrico de ambos maxilares, sino que también una remodelación de la cavidad glenoidea y el cóndilo.

• Mecanismos Regulación Postural

La regulación postural puede entenderse en base a tres modelos: neurofisiológico, biomecánico y psicosomático, que actúan como uno solo. Los dos primeros son los más estudiados.

1. El modelo neurofisiológico regula la postura como resultado de un proceso dinámico de entradas y salidas: Numerosas conexiones anatómicas han sido descritos entre los sistemas del trigémino y las estructuras nerviosas involucradas en el mantenimiento de la postura. Todas estas conexiones anatómicas sugieren que cambios en las estimulaciones del trigémino pueden causar un desequilibrio en los sistemas vestibular y oculomotor. Las entradas nociceptivas de la ATM, la musculosa masticatorios (MM), los músculos cervicales posteriores y los músculos del cuello y los hombros pueden producir un bombardeo aferente continuo en el núcleo trigémino espinal ⁽⁷⁾.

2. El modelo biomecánico organiza su control postural según múltiples cadenas musculares y faciales, que se relacionan unas con otras para actuar de modo complementario y mantener el tono postural fisiológico. El sistema cráneo–cervical es un componente integral del cuadrante superior corporal, la dinámica de este sistema consiste en mantener en equilibrio el cráneo sobre la columna vertebral, y esto se logra cuando los ojos miran horizontalmente. En esta posición, el plano oclusal es horizontal, así, los músculos masticadores se insertan en la base del cráneo, así como el sistema hioideo tracciona de la cintura escapular y a su vez esta se encuentra en relación indirecta y a un nivel más distal con la cintura pelviana, lo cual hace que cualquier alteración muscular tenga un gran efecto multiplicativo en la postura cérvico dorsal por un sistema de palanca. (Figura 13)

Durante la biomecánica de la dinámica cráneo–cervical se forma un sistema de palanca:

- Existe un punto de apoyo que está situado a nivel de los cóndilos occipitales
- La resistencia que constituye el peso de la cabeza aplicada a su centro de gravedad situado cerca de la silla turca
- Y la potencia, constituida por la fuerza de los músculos suboccipitales que en todo momento deben compensar el peso de la cabeza que tiende a hacerla caer hacia adelante como el plano auriculo-




Figura. 13. Esquema de Brodie.

nasal, que pasa por el borde superior del conducto auditivo externo y por la espina nasal anterior.

Otro elemento básico de la correlación entre la SS y la postura humana es la existencia de cadenas músculo-fasciales (MFC), el sistema fascial es importante no solo porque puede distribuir pasiva-

mente la tensión en los músculos del cuerpo cuando es estimulado mecánicamente, sino también porque contiene mecanorreceptores y posee una capacidad contráctil autónoma que influye en la tensión de las fascias⁽³²⁾. Estas tensiones se transmiten a lo largo de la MFC, lo que influye en la postura de todo el cuerpo. Todos los músculos de la cadena son mutuamente dependientes y se comportan como si fueran un solo músculo. Esto puede explicar por qué los trastornos de las funciones de MM, como masticar y tragar, pueden transmitirse a la musculatura distal. Somos elementos tensegriles, por lo cual cualquier modificación que se haga en una parte del cuerpo modifica todo el sistema a través del sistema miofascial.

3. El modelo psicossomático contribuye al esquema postural global por la estrecha relación que existe entre el cuerpo y la psique, así como por la influencia del estrés. La teoría psicossomatica explica como las emociones, el estrés, la ansiedad y otros hábitos tóxicos excitan el eje hipotálamo-pituitario-adrenal aumentando la actividad del sistema nervioso vegetativo lo que provoca la contracción de los tejidos - siendo los músculos de la boca puntos de gran somatización. Esto sería una influencia descendente. Por otra parte, los tejidos envían una señal ascendente gracias a los nociceptores. La despolarización de las terminaciones libres excita las vías ascendentes y puede llegar a estresar el sistema.

Caso 1: (Figs.14-15)

Se trata de una niña en dentición mixta, que presenta

una mordida borde a borde establecida funcionalmente y una clase III. Comenzamos tratamiento miofuncional y postural, llevamos 3 meses, sigue en curso.




Figura. 14. Caso Clínico 1.



Figura. 15. Caso Clínico 1.

Caso 2: (Figs.16-17)

Es un adulto, que presenta una clase II división segunda, con una gran sobremordida. Acude a consulta remitida por nuestro osteópata con un cuadro depresivo y de ansiedad severo. Presenta inestabilidad, sólo pudiendo estar sentado siendo su profesión dedica-

da al deporte con lo cual no puede incorporarse a su trabajo desde aproximadamente un año, llega a cursar con agorafobia por su cuadro de inestabilidad. Iniciamos tratamiento postural únicamente con desprogramación con plano metálico superior, y ahora en estudio para tratamiento con Invisaling, se incorporó a su vida normal al mes y medio de tratamiento.



Figura. 16. Caso Clínico 2.



Figura. 17. Caso Clínico 2.

Caso 3: (Figs.18-20)

Se trata de una adulta con sobremordida y clase II división segunda y una gran torsión mandibular izquierda. Presenta una rectificación cervical, es respiradora oral y con bruxismo céntrico severo. Migrañas diarias que le cursan baja laboral, y crisis de vértigos. Dolor de cuello, espalda y lumbares y un cuadro de

fatiga crónica. Acude estando en tratamiento en la unidad del dolor con opiáceos y pinchándose Botox cada 6 meses. Actualmente ningún tratamiento, salvo un ibuprofeno puntual por sus lesiones estructurales a nivel cervical. Hicimos tratamiento miofuncional y postural con reguladores funcionales y posterior rehabilitación oral en posición terapéutica con incrustaciones de disilicato.



Figura. 18. Caso Clínico 3.



Figura. 20. Caso Clínico 3.



Figura. 20. Caso Clínico 3.

Caso 4: (Figs.21-22)

Se trata de un niño en dentición mixta, que presenta una clase II con gran resalte. Es remitido a consulta por nuestro podólogo que necesitaba nuestra ayuda para poder tratar al pequeño. Tenía una rectificación

lumbar, cuadros de alergia e intolerancias alimenticias, mal descanso y ojos enrojecidos, y pies planos, con dolor de espalda frecuente. Comenzamos tratamiento miofuncional y postural, con reeducación de hábitos y actualmente en espera de recambio para completar su tratamiento con brackets.



Figura. 21. Caso Clínico 4.



Figura. 22. Caso Clínico 4.

• Signos y síntomas

Signos alteración CAPTOR oclusal

- Báscula contralateral de cinturas escapular y pélvica, báscula tampón de protección raquídea
- Limitación bilateral de la rotación cervical
- Rotación heterolateral de cintura escapular y pélvica
- Desórdenes psíquicos frecuentes

Síntomas alteración CAPTOR oclusal

- Dolores al final de la noche
- No pueden estar acostados mucho tiempo
- Nuca rígida al levantarse, se desbloquea a lo largo de la mañana
- Sintomatología alta: cervicalgias, cervicobraquialgias, cefaleas occipitales, neuralgia de Arnold...
- Otros: dolores faciales, odontalgias, hipersensibilidad dentinaria...

Los síntomas de alteración del sistema postural por un CAPTOR oclusal afectado son síntomas al final de la noche y matutinos antes de levantarse.

• Aplicaciones clínicas:

1. Rehabilitación oral y estética
2. Patologías de la atm
3. Biomecánica del deportista
4. Mejora del dolor crónico: cefaleas, migrañas...
5. Trastornos del equilibrio
6. Desarrollo infantil y trastornos del aprendizaje
7. Prevención de riesgos y patologías
8. Ronquido y apnea del sueño
9. Ortodoncia
10. Dislexia
11. Meniere, fibromialgia, tda.
12. Mejora del dolor crónico

La posturología ayuda a aliviar dolores musculoesqueléticos, como el de espalda, lumbalgias, cervicalgias, artrosis, trastornos mandibulares, etc., y neuro-vestibulares, como neuralgias, migrañas, vértigos, etc. y contribuye a evitar la cronificación de estos. Entre el 30 y el 40% de los dolores de espalda pueden estar causados o agravados por problemas dentales como una maloclusión, falta de piezas o una malposición.

DISCUSIÓN

Según la literatura revisada, creemos que existen correlaciones reales entre la postura y el SS. Sin embargo, debido a la complejidad de los factores involucrados, los estudios existentes han dejado brechas importantes en la comprensión. Por lo tanto, se necesitan más investigaciones controladas de los efectos clínicos a largo plazo de diferentes entradas estomatognáticas.

El aumento del balanceo postural puede indicar un malestar general causado por problemas en el SS, mientras que estas adaptaciones se mantengan en un cierto límite, pero cuando el problema se vuelve crónico, o nuestro umbral de adaptación se reduce (incluso después de una indigestión trivial), de repente comienza un dolor de cabeza molesto, una reducción de la visión, una extraña sensación de vértigo, un dolor o un ruido en la articulación de la mandíbula con dificultad para abrir la boca o masticar, o un dolor en el hombro, la rodilla o la espalda, recurrimos entonces a diferentes especialistas médicos cada uno de los cuales prescribe exámenes, diagnósticos específicos y terapias relacionadas. Sin embargo, para algunos síntomas, los resultados tardan en aparecer o se repiten cíclicamente y de manera cada vez más grave. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta revela el drama de época de la medicina moderna. Hoy, de hecho, estamos cada vez más especializados, tenemos máquinas que nos permiten hacer diagnósticos cada vez más específicos, medicamentos y técnicas quirúrgicas cada vez más potentes. Todo esto, por un lado, es ciertamente positivo, pero desafortunadamente ha resultado en que la terapia se dirija más al tratamiento del síntoma que a la causa que lo condujo y que hemos perdido de vista el concepto de unidad y globalidad del cuerpo humano.

El estudio de la postura representa la gran oportunidad para que nosotros los médicos confrontemos y redescubramos este enfoque global y, sobre todo, podamos ofrecerle al paciente la posibilidad de identificar sus problemas antes de que se conviertan en patologías crónicas para las cuales también se reequilibra la postura. Sería insuficiente. En última instancia, se trata de practicar la verdadera prevención de enfermedades de múltiples partes recomendada, pero pocas realmente implementadas. Nuestra experiencia clínica sugiere que un enfoque interdisciplinario es confiable y suficiente para hacer diagnósticos y desarrollar planes de tratamiento. Este enfoque debe involucrar a una variedad de expertos en rehabilitación postural, incluidos logopedas, ortopedistas, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, oculistas, optometristas y especialistas en oído, nariz y garganta.

Debido a la relación íntima que existe entre el sistema postural y estomatognático, el profesional de la odon-

tología debería plantearse la necesidad de incluir en la historia médica del paciente las posibles alteraciones a nivel postural, así como sus consecuencias en nuestro sistema y viceversa, teniendo en cuenta que, una modificación en el ámbito oral puede traer consecuencias a largo plazo en ambos sistemas. Se necesitan futuras investigaciones para demostrar las posibles consecuencias de una mala praxis a nivel estomatognático y su relación con la patología postural.

CONCLUSIONES

La postura corporal, no representa más que la punta del iceberg, de un sistema mucho más complejo, donde a través de unos receptores sensitivos propios y exteroceptores, se realiza la interconexión entre este sistema de entrada y el sistema de salida que son las adaptaciones biomecánicas realizadas por el sistema locomotor.

La organización postural comienza desde el cráneo y comienza ya en el útero materno. Es el crecimiento craneofacial el que determina la posición de la cabeza en el espacio y de él salen todos los mensajes para una postura correcta. La oclusión de los dientes y todas las funciones de la esfera oro-nasal (respiración, deglución, masticación) son, por lo tanto, de fundamental importancia para el equilibrio postural. Se puede concluir que la razón del desencadenamiento de muchos síntomas posturales dolorosos se encuentra en el hecho de que no se cumplen las condiciones para una oclusión estable, ya que ciertas situaciones clínicas conllevan mandíbula para cerrar de una manera excéntrica.

La maloclusión tiene el significado de una respuesta adaptativa inteligente de un sistema biológico a factores desestabilizadores, mientras que la terapia es la de una "reprogramación postural inteligente" que se logra con la combinación de ayudas terapéuticas más funcionales, con respecto a la fisiología individual (Teoría cibernética). Los estudios sobre neuroplasticidad de hoy muestran que, al modificar arbitrariamente la oclusión, el cerebro y la neurofisiología cambian estructural y funcionalmente.

Por tanto, podemos modificar este esquema adaptativo si intervenimos temprano en el desarrollo del sistema craneofacial, donde se origina la maloclusión y, sobre todo, corregir las funciones (respiración, deglución, masticación) ciertamente alteradas para lograr un nuevo "equilibrio dinámico" entre los componentes del sistema estomatognático que sea el menos destructivo, el menos inestable, el menos energéticamente costoso, en el absoluto respeto del esquema cráneo-Postural individual. En la edad adulta, la maloclusión puede representar "la mejor oclusión posible" para el sujeto y la modificación, siguiendo los dictados estéticos, podría alterar la organización

propioceptiva neurológica de la cabeza en primis (oculocefalógico) y luego de todo el sistema postural.

BIBLIOGRAFÍA

1. Restrepo CC, Quintero Y, Tamayo M, Tamayo V. Efecto de la posición craneocervical en las funciones orales fisiológicas. *Rev. CES Odontol* 2008.
2. Fernández de las peñas, C; Alonso Blanco, C; Miangolarra Page, J.C, Integración funcional de la articulación temporomandibular y el raquis cervical. Quintessence. Publicación de odontología, 2004.
3. Rocabado M. Análisis biomecánico cráneo-cervical a través de una teleradiografía a lateral. *Rev. Chilena Ortod*. 1984; 1(1):42-52.
4. Medina C. Prevalencia de maloclusiones dentales en un grupo de pacientes Pediátricos. *Acta odontol. venez* 2010; 16-48 (1).
5. Susanibar F., Castillo J., Douglas C.R., Marchesan I.O., Santos R. Motricidad orofacial. Ed. Eos. Vol.2; cap3:97-116
6. Novo MJ, Changir M, Quirós AO. Relación de las alteraciones plantares y las maloclusiones dentarias en niños. *Rev Latinoam Ortod y Odontop* 2013.
7. Meerssman GM, Esposito GM. Valutazione delle relazioni fra occlusione e postura. *Il Dentista moderno*. 1988; 6:5-9.
8. Barata-Caballero D, Mencía-Marrón A, Durán-Porto A. Relación entre oclusión y postura (II). *Fisiopatología de la mordida cruzada*. *Gaceta Dental* 2011; 187:124-139.
9. Bricot B. *Reprogrammation posturale globale*. Paris: Sauramps Medical Marseille. France. 2009.
10. PM Gagey - *Ann. Kinésithér.*, 1993, t. 20, no 6 , pp 285-288 ©Masson, Paris, 1993
11. Rodríguez Romero B, Mesa Jiménez J, Pa-seiro Ares G, González Doniz ML. Síndromes posturales y reeducación postural en los trastornos Temporomandibulares. *Rev Iberoam Fisioter Kinesol*. 2004.
12. Stefanelli, G. El sistema estomatognático en el contexto postural. En: Susanibar F., Castillo J., Douglas CR., Marchesan I. & Santos R. *Motricidad Orofacial: Fundamentos Basados en Evidencia*. Madrid, EOS. 2016.
13. Stefanelli, G. *Craniodonzia*. El sistema ALF. Ed. Nike. Madrid. 2013.
14. Rivero Lesmes JC. "De la cabeza a los pies". *Posturología y oclusión*. 2003.
15. Rodríguez Romero B, Mesa Jiménez J, Pa-seiro, Ares G, González Doniz ML. Síndromes posturales y reeducación postural en los trastornos temporomandibulares. *Rev Iberoam Fisioter Kinesol*. 2004.
16. Barata-Caballero D, Mencía-Marrón A, Durán-Porto A. Relación entre oclusión y postura (II). *Fisiopatología de la mordida cruzada*. *Gaceta Dental* 2011; 187:124-139.
17. Michelotti A, Manzo P, Farella M, Martina R. Occlusion and posture: is there evidence of correlation? *Minerva Stomatol* 1999;48: 525-534.
18. Espósito GM, Meersseman JP. Evaluación de la relación existente entre la oclusión y la postura. *Rev Dent Modern*. 1988.
19. Bobes Basarán J. Odontoposturologí a: un nuevo campo de actuación para los dentistas. *Gac Dent* 2013 Oct; 251:104-20.
20. Bracco P, Deregibus A, Piscetta R. Effects of different jaw relations on postural stability inhuman subjects, *Neurosci Lett*. 2004; 356:228-30.
21. Fujimoto M, Hayakawa I, Hirano S, Watanabe I. Changes in gait stability induced by alteration of mandibular position. *J Med Dent Sci*. 2001,48:131-6.
22. Motoyoshi M, Shimazaki T, Sugai T, Na-mura S. Biomechanical influences of head posture on occlusion: an experimental study using finite element analysis. *Eur J Orthod* 2002.
23. D'Attilio M, Caputi S, Epifania E, Festa F, Tecco S. Evaluation of cervical posture of children in skeletal Class I, II, and III. *Cranio* 2005; 23:219-228.
24. Zepa I, Hermerinta K, Kovero O, Nissimen, Kononen M, Huggare J. Associations bet-ween thoracic Khyphosis, head posture and craniofacial morphology in young adults. *Acta Odontol Scand* 2000; 58 (6): 237.-242
25. Esposito GM, Meersseman JP. Valutazione della relazione esistente tra l'occlusione e la postura. *Dent Mod*. 1988, 5:923-941.
26. Sharav Y, Benoliel R. *Dolor orofacial y ce-falea*. Barcelona: Elsevier-Mosby 2011.
27. Silvestrini-Biavati A, Migliorati M, Demar-ziani E, Tecco S, Silvestrini-Biavati P, Polimeni A, Saccuci M. Clinical association between teeth mal-

clusions, wrong posture and ocular convergence disorders and epidemiological investigation on primary school children. *BMC Pediatrics* 2013; 13: 12-20.

28. Tingey EM, Bushang PH, Throckmorthn GS. Mandibular rest position: a reliable position influenced by head support and body posture. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 2001; 120: 614-22.

29. Rivero Lesmes JC. "De la cabeza a los pies". *Posturología y oclusión* [Internet]. 2003.

30. D'Attilio, Caputi S, Epifania E, Tecco S. Evaluation of cervical posture of children in skeletal class II and III. *Cranio* 2005; 23: 219-228.

31. D'Attilio, Caputi S, Epifania E, Tecco S. Evaluation of cervical posture of children in skeletal class II and III. *Cranio* 2005; 23: 219-228.

32. Myers TW. *Anatomy trains: myofascial meridians for manual and movement therapists*. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2001.

EXPOSICIÓN QUIRÚRGICA ABIERTA VS. CERRADA EN RESCATE DE CANINOS IMPACTADOS. A PROPÓSITO DE UN CASO BILATERAL EN PALATINO.

García Galdeano, C; Martín Gómez, A; Álvarez Marín, R; Fernández-Figares Conde I; Gutiérrez Corrales, A; Torres Lagares, D; Gutiérrez Pérez, JL.

Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN

El canino maxilar permanente es el segundo diente en frecuencia, después del tercer molar inferior, en no hacer erupción en su ubicación correcta en boca. Este fenómeno se describe como ectópico, desplazado o impactado y su tasa de prevalencia es del 1-3 %, siendo alrededor del 8 % de los casos reportados un fenómeno bilateral.⁽¹⁾

Los caninos ectópicos pueden desplazarse en sentido palatino o bucal. Se viene reportando desde hace años que la mayoría de los caninos ectópicos (85%) se desplazan hacia el paladar. Sin embargo, un estudio de tomografía computarizada (TC) publicado más recientemente sugiere que esta cifra es del 50%, siendo el resto desplazamientos en sentido bucal o en la línea del arco.⁽²⁾

El manejo de un canino impactado en paladar es complejo y la elección de tratamiento está influenciada por varios factores, tales como la ubicación, la gravedad de la impactación y la edad del paciente.⁽³⁾ Dado el alto valor estético y funcional, es importante reubicarlos en su lugar apropiado dentro del arco dentario.⁽⁴⁾ La radiografía permite estimar la necesidad del tratamiento, la dificultad del mismo y la probabilidad de éxito esperada; así como determinar el tratamiento del que cabe esperar una mejor resolución del caso.⁽⁵⁾ En general, se recomienda reubicarlo en su posición correcta si el desplazamiento no es demasiado grave y el paciente es apto para el tratamiento de ortodoncia. Si se opta por esta opción, es necesario exponer parte de la corona enterrada mediante un procedimiento quirúrgico seguido de un tratamiento ortodóncico para traccionarlo hasta su posición correcta.^(3,6)

En la actualidad se pueden utilizar dos principales técnicas quirúrgicas para este fin: técnica cerrada y técnica abierta.⁽⁶⁾

La técnica cerrada implica levantar un colgajo mucoperióstico y eliminar el hueso que cubre parte de la porción de la corona donde se adherirá un elemento ortodóncico. El colgajo es reposicionado cubriendo la corona y la cadena sale a la cavidad oral a través de él. Poco después de la cirugía, se utiliza un aparato ortodóncico para aplicar fuerzas suaves y llevar al canino a su posición correcta dentro del arco dental.

La exposición quirúrgica abierta implica dejar expuesta al medio oral la porción de la corona descubierta. La técnica clásica consiste en eliminar de forma directa una ventana del tejido situado por encima del diente sin levantar colgajo y colocar un apósito que será retirado aproximadamente a los 10 días. Pasado este tiempo es cuando se coloca el aditamento de ortodoncia y el diente comienza a ser traccionado, por encima de la encía, a su posición correcta.⁽⁶⁾

Del mismo modo, existen variantes quirúrgicas dentro de estas dos principales alternativas:⁽²⁾

A) Variantes quirúrgicas de la técnica de exposición abierta:

1. Técnica en ventana: Eliminación quirúrgica directa de la mucosa y el hueso que recubre el diente impactado.
2. Procedimiento abierto con colgajo: Implica levantar un colgajo palatino de espesor completo, exponer el diente y posteriormente reposicionarlo previa realización de una ventana (porción circular de fibromucosa) en el mismo que deje expuesta la porción del diente descubierta.
3. Técnica de colgajo reposicionado apicalmente: su indicación principal es el diente impactado en vestibular por encima de la línea mucogingival, pero no desplazado distal o mesialmente de su posición de erupción ideal.

B) Variantes quirúrgicas de la técnica de exposición cerrada:

1. Técnica de exposición mínima: Implica levantar un colgajo, eliminar el área de hueso mínima que permita visualizar el folículo y cortar una ventana del mismo para exponer la superficie de corona suficiente donde adherir el aditamento ortodóncico. La mayoría del folículo se deja intacto. El colgajo es reposicionado saliendo solo la ligadura o la cadena a través del borde suturado.
2. Técnica de exposición máxima: Similar a la anterior, se diferencia en la enucleación completa del folículo para lograr la exposición del diente en su circunferencia máxima.

EXPOSICIÓN QUIRÚRGICA ABIERTA VS. CERRADA EN RESCATE DE CANINOS IMPACTADOS. A PROPÓSITO DE UN CASO BILATERAL EN PALATINO

3. Técnica en túnel: El canino debe estar impactado cerca del alveolo del canino temporal que se va a extraer de forma simultánea a la exposición quirúrgica, ya que tras reposicionar el colgajo la cadena ortodóncica saldrá por dicho alveolo.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es valorar el papel de ambas técnicas quirúrgicas, abierta y cerrada, y visualizar un ejemplo de cada una de ellas a través de la exposición de un único caso clínico en paladar operado en el Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla. En este caso se observa la variante en túnel de la técnica cerrada y la variante con colgajo de la técnica abierta.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 14 años que acude al Máster de Ortodoncia de la Universidad de Sevilla por presentar patología de erupción y apiñamiento dentario. Presenta inclusión dentaria bilateral de caninos superiores por palatino. Una vez evaluado el caso por el ortodoncista, se decide la exodoncia simultánea de los caninos temporales superiores junto a la etapa quirúrgica del rescate de los caninos definitivos. Es derivado al Máster de Cirugía Bucal en abril de 2019 con el objetivo de realizar el componente quirúrgico del plan de tratamiento (Figura 1).



Figura 1. Inicial.

Bajo anestesia local (Figura 2), se realizaron dos incisiones festoneadas por palatino: desde mesial de 11 a distal de 14 en cuadrante uno y desde mesial de 2.1 a distal de 25 en segundo cuadrante, evitando de esta forma **el despegamiento** del paquete vasculonervioso nasopalatino (Figura 3).

Ambos caninos fueron expuestos de igual forma: despegamiento y levantamiento de colgajo palatino de espesor total; y descubrimiento de la corona mediante ostectomía con pieza de mano sin alcanzar el cuello de la corona ni alterar la estructura cementaria (Figura 4 y 5).



Figura 2. Anestesia.



Figura 3. Incisión.




Figura 4. Despegamiento.

Posteriormente, una vez controlado el sangrado, se adhirió un botón con una cadeneta de ortodoncia en la cara vestibular de ambos caninos. Las exodoncias de 5.3 y 6.3 se realizaron de forma simultánea a la cirugía antes de reposicionar los colgajos (Figuras 6,7,8 y 9).

Ambos colgajos fueron suturados con sutura de 4/0 y puntos de colchonero verticales a nivel de las papilas interdentes.

Se dieron indicaciones postoperatorias que incluían apretar una gasa sobre el paladar las primeras horas postoperatorias para evitar la formación de hematomas bajo la fibromucosa palatina, así como la reali-

ción de enjuagues con clorhexidina al 0.12 % dos veces al día durante 15 días.

La primera revisión se realizó a la semana para retirada de sutura y las siguientes las realizó el ortodoncista en los sucesivos meses para control de la parte ortodóncica del tratamiento (Figuras 11, 12 y 13).




Figura 5. Exposición.



Figura 8. Descubrimiento 23.



Figura 6. Cementado botón 13.




Figura 9. Exodoncia caninos temporales.




Figura 7. Fenestración colgajo 13.




Figura 10. Sutura.

EXPOSICIÓN QUIRÚRGICA ABIERTA VS. CERRADA EN RESCATE DE CANINOS IMPACTADOS. A PROPÓSITO DE UN CASO BILATERAL EN PALATINO



Figura. 11. Revisión 1 semana.



Figura. 12. Revisión 1 mes.



Figura. 13. Revisión 7 meses.

DISCUSIÓN

Distintos estudios han comparado ambas técnicas quirúrgicas en paladar, abierta y cerrada, considerando parámetros tales como duración de tratamiento, salud periodontal final, estética resultante y

recuperación del paciente.^(7,8)

Cuando se hace una búsqueda en la literatura, es notable la escasez de estudios de calidad y revisiones referentes a la comparación de ambas técnicas en caninos desplazados a palatino.^(4,8,9,10) Respecto a los estudios que comparan ambas técnicas en vestibular y palatino, ocurre algo similar, siendo las revisiones sistemáticas escasas.⁽⁴⁾

En unos de los ensayos clínicos considerados de mejor evidencia^(11,12,13) para los resultados periodontales y estéticos de caninos impactados en paladar, no se han encontrado ninguna diferencia entre ambas técnicas de exposición.^(7,10,14) Tampoco se han encontrado diferencias clínicamente relevantes en los resultados periodontales de caninos impactados en vestibular.⁽¹⁵⁾

En una revisión sistemática reciente centrada en caninos desplazados a palatino, se observó que la literatura actual no proporciona evidencia suficiente para afirmar que una técnica sea superior a otra.⁽⁶⁾ En el resultado estético parece que hubo poca o ninguna diferencia al comparar caninos operados y no operados al final del tratamiento, por lo que no es sorprendente que no haya diferencias en el resultado estético cuando se comparan entre ambos procedimientos. Sucede similar con la salud periodontal: aunque se detectó una diferencia estadísticamente significativa entre los caninos no operados y operados, ésta fue pequeña (0.5 mm) y es poco probable que sea clínicamente relevante. No obstante, no se puede estar seguro de los hallazgos expuestos, pues la calidad de la evidencia de los artículos es de baja a muy baja.⁽⁶⁾

Al comparar la duración del procedimiento quirúrgico, parece ser menor si la técnica es abierta.⁽¹⁶⁾ Para la variable dolor/molestias postoperatorias, si bien no se encuentran diferencias significativas entre ambas técnicas quirúrgicas,^(6,16) existe una recuperación más rápida de las mismas si la técnica es cerrada.⁽¹⁶⁾

Respecto a la necesidad de reintervenciones, se ha informado que ésta es mayor si la técnica es cerrada, así como el número de citas^(7,17) y la duración del tratamiento de ortodoncia activo^(4,18); sin verse aumentado, a pesar de ello, la duración del tratamiento en su totalidad.^(7,18) Otros autores tampoco encuentran diferencias en la duración del tratamiento al comparar ambas técnicas.⁽⁶⁾

Por otro lado, se ha asociado a la técnica abierta con probabilidades significativamente menores de anquilosis.⁽¹⁴⁾

Hay autores que presentan preferencias personales para elegir una técnica u otra y consideran que el levantamiento de colgajo ofrece un mayor campo qui-

rúrgico donde el colgajo, principal fuente de sangrado, está alejado del área de adhesión. Además, al ofrecer mayor visibilidad, se puede controlar mejor la mínima eliminación de hueso para ubicar el aditamento ortodóncico.⁽⁹⁾

Se debe considerar en el análisis del resultado de cada caso clínico que es difícil controlar todos los factores que influyen en él, pudiendo ser éstos numerosos⁽²⁾. Por ejemplo, respecto a la duración se ha visto que la tracción ortodóncica activa del canino impactado en el maxilar está influenciada principalmente por el sexo del paciente, la impactación bilateral, la ubicación centrada bicorticalmente y la localización en sector 4 ó 5 cerca de la línea media, lo que aumenta el tiempo de tracción en algunos meses.^(19,20)

CONCLUSIONES

1.- La literatura actual no proporciona evidencia suficiente para afirmar que una técnica sea superior a otra. Ambas parecen ser una intervención exitosa, son versátiles y se pueden adaptar a cada caso según las preferencias del clínico.

2.- Los estudios de calidad comparativos son escasos, por lo que se requieren más ensayos clínicos aleatorios de calidad para determinar los resultados y posibles complicaciones de cada una de las técnicas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bishara SE, Ortho. D. Impacted maxillary canines: A review. *Am J Orthod Dentofac Orthop.* 1992;101(2):159-71.

2. Ericson S, Kuroi J. Incisor Root Resorptions Due to Ectopic Maxillary Canines Imaged by Computerized Tomography: A Comparative Study in Extracted Teeth. *Angle Orthod.* 2000;70(4):276-83.

3. Parkin N, Bazargani F, Benson PE, Atwal A. Interventions for promoting the eruption of palatally displaced permanent canine teeth, without the need for surgical exposure, in children aged 9 to 14 years. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;2017 (10).

4. Cassina C, Papageorgiou SN, Eliades T. Open versus closed surgical exposure for permanent impacted canines: A systematic review and meta-analyses. *Eur J Orthod.* 2018;40(1):1-51.

5. Eslami E, Barkhordar H, Abramovitch K, Kim J, Masoud MI. Cone-beam computed tomography vs conventional radiography in visualization of maxillary impacted-canine localization: A systematic review of comparative studies. *Am J Orthod Dentofac Orthop*

[Internet]. 2017;151(2):248-58.

6. Parkin N, Benson PE, Thind B, Shah A, Khalil I, Ghafoor S. Open versus closed surgical exposure of canine teeth that are displaced in the roof of the mouth. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;2017(8).

7. Bertl MH, Foltin A, Giannis K, Vasak C, Bernhart T, Strbac GD. Influence of repeat surgery on treatment time in the interdisciplinary management of impacted maxillary canines: A retrospective cohort study. *J Cranio-Maxillofacial Surg.* 2016;44(7):843-7.

8. Parkin, N., Benson, P. E., Thind, B. and Shah, A. (2008) Open versus closed surgical exposure of canine teeth that are displaced in the roof of the mouth. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 8, CD006966.

9. Becker A, Zogakis I, Luchian I, Chaushu S. Surgical exposure of impacted canines: Open or closed surgery. *Semin Orthod* [Internet]. 2016;22(1):27-33.

10. Sampaziotis D, Tsolakis IA, Bitsanis E, Tsolakis AI. Open versus closed surgical exposure of palatally impacted maxillary canines: comparison of the different treatment outcomes—a systematic review. *Eur J Orthod.* 2018;40(1):11-22.

11. Parkin NA, Deery C, Smith AM, Tinsley D, Sandler J, Benson PE. No difference in surgical outcomes between open and closed exposure of palatally displaced maxillary canines. *J Oral Maxillofac Surg* [Internet]. 2012;70(9):2026-34.

12. Parkin NA, Freeman J V., Deery C, Benson PE. Esthetic judgments of palatally displaced canines 3 months postdebond after surgical exposure with either a closed or an open technique. *Am J Orthod Dentofac Orthop* [Internet]. 2015;147(2):173-81.

13. Parkin NA, Milner RS, Deery C, Tinsley D, Smith AM, Germain P, et al. Periodontal health of palatally displaced canines treated with open or closed surgical technique: A multicenter, randomized controlled trial. *Am J Orthod Dentofac Orthop* [Internet]. 2013;144(2):176-84.

14. Koutzoglou SI, Kostaki A. Effect of surgical exposure technique, age, and grade of impaction on ankylosis of an impacted canine, and the effect of rapid palatal expansion on eruption: A prospective clinical study. *Am J Orthod Dentofac Orthop* [Internet]. 2013;143(3):342-52.

15. Incerti-Parenti S, Checchi V, Ippolito DR, Gracco A, Alessandri-Bonetti G. Periodontal status after surgical-orthodontic treatment of labially im-

pacted canines with different surgical techniques: A systematic review. *Am J Orthod Dentofac Orthop* [Internet]. 2016;149(4):463-72.

16. Gharaibeh TM, Al-Nimri KS. Postoperative pain after surgical exposure of palatally impacted canines: closed-eruption versus open-eruption, a prospective randomized study. *Oral Surgery, Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontology*. 2008;106(3):339-42.

17. Burden DJ, Mullally BH, Robinson SN. Palatally ectopic canines: closed eruption versus open eruption. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1999;115(6):640-4.

18. Naoumova J, Rahbar E, Hansen K. Glass-ionomer open exposure (GOPEX) versus closed expo-

sure of palatally impacted canines: A retrospective study of treatment outcome and orthodontists' preferences. *Eur J Orthod*. 2018;40(6):617-25.

19. Arriola-Guillén LE, Aliaga-Del Castillo A, Ruíz-Mora GA, Rodríguez-Cárdenas YA, Dias-Da Silveira HL. Influence of maxillary canine impaction characteristics and factors associated with orthodontic treatment on the duration of active orthodontic traction. *Am J Orthod Dentofac Orthop*. 2019;156(3):391-400.

20. Parkin N, Furness S, Shah A, Thind B, Marsman Z, Glenroy G, et al. Extraction of primary (baby) teeth for unerupted palatally displaced permanent canine teeth in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;2018(3).

QUISTE RESIDUAL MANDIBULAR: ENUCLEACIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO.

Rodríguez Amarillo, R; Fernández Asian, I; Rizcala Orlando, Y; Batista Cruzado, A; Torres Lagares, D; Gutiérrez Pérez, JL.

Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN

Un quiste es definido como: cavidad patológica que tiene contenido fluido o gaseoso y está envuelto por una membrana de tejido epitelial (aunque este revestimiento no sea esencial para su diagnóstico), pero no creado por la acumulación de pus.⁽¹⁾

Las características clínicas de los quistes de la mandíbula se caracterizan por un crecimiento lento y una expansión asintomática, a menos que se infecten secundariamente o sean muy grandes. La expansión del hueso se observa comúnmente en la cortical bucal, pero en los quistes de gran extensión, las corticales tanto bucales como linguales pueden expandirse notablemente.⁽²⁾

Los quistes odontogénicos son un trastorno único que afectan los tejidos orales y surgen como resultado de causas patógenas inflamatorias o del desarrollo. Los cuatro quistes odontogénicos más frecuentes son los quistes radiculares (RC), quistes dentígeros, quistes residuales y queratoquistes odontogénicos (OKC).

Quiste Radicular (Apical, lateral y residual):

• Quiste Apical

Los quistes radiculares apicales son los más comunes en los maxilares, causados por procesos inflamatorios. Todos están asociadas con dientes no vitales e identificados en los ápices de los dientes. La mayoría de los casos se manejan mediante tratamiento de conducto radicular y cirugía periapical o mediante extracciones. Los síntomas dependen del estado de la inflamación y la expansión cortical suele ser unilateral, aunque la ocurrencia bilateral también se ha documentado.⁽³⁾

• Quiste lateral

Quiste odontogénico del desarrollo derivado de restos de lámina dental. Poco común pero bien reconocido, tiende a ocurrir en la región premolar mandibular. El quiste generalmente se identifica como radiolucidez unilocular bien definida entre las raíces de los premolares mandibulares vitales con o sin divergencia de la raíz.⁽⁴⁾

• Quiste residual

El quiste que permanece en el hueso del maxilar al finalizar la exodoncia se denomina quiste residual. El quiste puede permanecer asintomático a menos que se agrande y cause efectos de presión.

El quiste residual radiológicamente muestra radiolucidez unilocular bien definida en el sitio de extracción previa. Un borde delgado radioopaco puede rodear el área radiolúcida. Los casos sintomáticos y los quistes residuales más grandes deben tratarse mediante el abordaje quirúrgico.⁽⁴⁾

Quiste dentígero

El quiste dentígero es el segundo quiste más común y se deben a alteraciones en el desarrollo. Casi todo el quiste dentígero encierra la corona de un diente no erupcionado y el área radiolúcida se une al diente en la unión cemento-esmalte. Estos quistes poseen áreas radiolúcidas uniloculares bien definidas. El manejo del quiste dentígero se realiza mediante la enucleación del quiste junto con la extracción del diente no erupcionado asociado, aunque el diente también puede conservarse.^(3,4)

Queratoquiste Odontogénico

Surge de los restos de lámina dental en la mandíbula o el maxilar. La zona mandibular posterior es el sitio de afectación más frecuente. Se caracterizan por una cavidad llena de líquido, con alta tasa de recurrencia, un comportamiento clínico agresivo y tienen menor tendencia a expandirse bucolingualmente que a extenderse anteroposteriormente y pueden cruzar la línea media del hueso de la mandíbula durante el proceso de expansión del mismo.⁽⁵⁾

Respecto a los diferentes procedimientos quirúrgicos de tratamiento frente a este tipo de lesiones, se pueden realizar los siguientes:

La enucleación, también llamada operación de Partsch II o cistectomía, es una técnica quirúrgica que requiere la extirpación completa del saco del quiste y la curación de la herida por intención primaria. La lesión se separa del hueso sin extirpar el hueso a lo largo de un plano de tejido entre la envoltura del tejido conectivo y el hueso circundante.⁽⁶⁾

La marsupialización de los quistes de las mandíbulas con retención de parte del revestimiento, defendida por Partsch en 1892, crea una comunicación o bolsa más grande que conecta las cavidades orales y quísticas después de quitar el techo de la pared externa del quiste y suturar la pared del quiste a la mucosa oral.^(7,8)

**QUISTE RESIDUAL MANDIBULAR:
ENUCLEACIÓN.
A PROPÓSITO DE UN CASO**

La descompresión, propuesta por Thoma en 1958, requiere un tubo de drenaje de polietileno o goma de diámetro pequeño que se sutura in situ o se une a un diente adyacente o a brackets de ortodoncia con un alambre de ligadura de acero inoxidable, creando una abertura o conexión más pequeña entre el quiste y el ambiente oral hasta que se forme una hendidura epitelial. El procedimiento de descompresión puede ser más fácil de realizar y más conservador que la marsupialización.⁽⁹⁾

OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es presentar un caso clínico apoyado en la evidencia científica donde se realizará el tratamiento de un quiste residual en un paciente, realizando la enucleación del mismo como técnica seleccionada.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente varón de 45 años, acude a la Facultad de Odontología procedente del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Los antecedentes médicos no son relevantes ni condicionantes. En la evaluación realizada en el HUVR observaron focos de infección relacionados con diferentes dientes y el tratamiento de elección fue la extracción de éstos, ya que su conservación resultaba inviable. A los seis meses se reevaluó al paciente y se observó en el tercer cuadrante la presencia de un quiste residual de 19x13mm aproximadamente (Figura 1), motivo por el cual se atendió en la Facultad de Odontología. Posteriormente, tras la enucleación del quiste, se mandó la muestra a analizar por anatomía patológica para su diagnóstico definitivo.




Figura. 1. Medición estado inicial.

Antes del inicio de la cirugía, el paciente fue debidamente informado de todo el procedimiento que se iba a realizar y con el consentimiento informado entregado y firmado por el paciente.

Se realizó anestesia locoregional de manera infiltrati-

va y perilesional, tanto por zona vestibular como por zona lingual. Una vez comprobado el efecto anestésico, se realizó una incisión crestal aproximadamente desde la posición del 3.4 a la del 3.6, continuándose con un ligero despegamiento de los tejidos (Figuras 2, 3). El quiste a nivel crestal se deja intuir en una pe-



Figura. 2. Inicial.



Figura. 3. Incisión.

queña comunicación y con pieza de mano y fresa de tungsteno se aumenta dicha comunicación para tener un mejor acceso (Figuras 4, 5). Mediante la utilización




Figura 4. Despegamiento.



Figura 5. Desarrollo de la intervención.

de cucharilla se va despegando la bolsa quística de las paredes, primero en la zona más coronal y poco a poco profundizando hasta su porción más apical, hasta conseguir extraer la totalidad de la capsula quística (introducida en un bote para su análisis en anatomía patológica) (Figuras 6-8). La sutura de la incisión se



Figura 6. Lesión quística.




Figura 7. Cavity quística..



Figura 8. Final.

realizó con monofilamento 5/0 (Figura 9) y posteriormente, se procedió a explicar las normas postoperatorias, se le recetó antiinflamatorios y analgésicos y se le citó una semana después para su revisión.




Figura 9. Muestra para AP.

DISCUSIÓN

La literatura indica que los quistes radicales son los quistes más frecuentes en las mandíbulas¹⁰. Se tratan inicialmente con enucleación. Solo los quistes radicales grandes se tratan con descompresión cuando la enucleación pueda dañar las estructuras circundantes, o en el caso de pacientes geriátricos y de alto riesgo.⁽¹¹⁾

El manejo de los quistes en relación con sus tamaños continúa siendo discutido. Jeong y cols. Llegaron a la conclusión que el tamaño inicial del quiste influye en el resultado de la descompresión⁽¹²⁾, mientras que Anavi et al. no encontraron ninguna influencia del tamaño del quiste inicial en el resultado de la descompresión. Sin embargo, la descompresión seguida de enucleación se utiliza con mayor frecuencia cuando el diámetro del quiste excede los 40 mm.⁽¹³⁾

La relación entre la edad del paciente y la tasa de reducción del tamaño del quiste después del tratamiento aún no está clara. Algunos estudios han encontrado que la edad del paciente es un factor importante en el proceso de curación del quiste⁽¹⁴⁾, mientras que otros no han podido encontrar una correlación.⁽¹¹⁾

La reparación en sí y la capacidad de poder hacerlo, del hueso, puede verse afectada en pacientes en condiciones patológicas; debido a lo cual la GBR se ha aplicado como técnica complementaria para los defectos óseos después de la eliminación de quistes maxilares en humanos con buenos resultados.^(11,12)

En el estudio de Santamaria y cols. se observó que hubo una restitución progresiva de la cavidad quística residual por tejido calcificado. Obteniendo una respuesta ósea reparadora similar en todos los grupos a los seis meses de seguimiento, independientemente de si se utilizó una membrana o no.⁽¹⁵⁾

Según Chiapasco y cols. existen muchos estudios que apoyan el uso de injertos óseos autógenos o materiales aloplásticos para reducir el riesgo de fractura mandibular y acortar el período de curación después de la enucleación del quiste, aunque los resultados de este estudio muestran que se obtuvo curación sin complicaciones y regeneración espontánea del hueso en todos los casos sin uso de ningún tipo de material de injerto. El proceso de curación fisiológica, con su reorganización mediante el coágulo de sangre, fue suficiente para una espontánea regeneración ósea, incluso en presencia de grandes cavidades residuales.⁽¹⁶⁾

CONCLUSIONES

La enucleación y legrado son los métodos de tratamiento quirúrgico más utilizados siempre que sea posible.

El defecto óseo después de la enucleación está completamente rodeado por paredes óseas sólidas separadas del sitio de abordaje facilitando un coágulo estable que conduce a un proceso de curación regular y seguro.

Las principales ventajas de la descompresión son que ahorra tejido, minimiza la probabilidad de daño a las estructuras adyacentes. Las desventajas de la descompresión incluyen la duración del tratamiento, la incomodidad y la dependencia del cumplimiento del paciente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Killely HC, Kay LW, Seward GR. Benign cystic lesions of the jaws, their diagnosis and treatment, ed 3. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1977:18-28, 33-44.
2. Ochsenius G, Escobar E, Godoy L, Peñafiel C. Odontogenic cysts: analysis of 2,944 cases in Chile. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2007;12:85-91.
3. Parkar MI, Belgaumi UI, Suresh KV, et al. Bilaterally symmetrical infected radicular cysts: Case report and review of literature. *J Oral Maxillofac Surg Med Pathol* 2017;29:458-62.
4. Karam N, Karam F, Nasseh I, et al. Residual cyst with a misleading clinical and radiological appearance. *J Oral Maxillofac Radiol* 2013;1:17-20.
5. Wright JM, Odell EW, Speight PM, et al. Odontogenic tumors, WHO 2005: where do we go from here? *Head Neck Pathol* 2014;8:373-82.
6. Nyimi BF, Yifang Z, Liu B. The changing landscape in treatment of cystic lesions of the jaws. *J Int Prev Community Dent* 2019 Aug 6;9:328-337
7. Huang IY, Lai ST, Chen CH, Chen CM, Wu CW, Shen YH Surgical management of ameloblastoma in children. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2007;104: 478-85
8. Zhao YF, Wei JX, Wang SP Treatment of odontogenic keratocysts: A follow-up of 255 Chinese patients. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2002;94:151-6
9. Ji-Su O, Jae-Seek Y, Su-Gwan K Clinical and histomorphometric evaluation of decompression followed by enucleation in the treatment of odontogenic keratocyst. *J Dent Sci* 2018;13:329-33.
10. Demirkol M, Ege B, Yanik S, Aras MH, Ay S. Clinicopathological study of jaw cysts in southeast region of Turkey. *Eur J Dent.* 2014;8:107-11.

11. Marin S, Kirnbauer B, Rugani P, Mellacher A, Payer M, Jakse N. The effectiveness of decompression as initial treatment for jaw cysts: A 10year retrospective study. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2019 Jan 1;24:47-52.

12. Jeong HG, Hwang JJ, Lee SH, Nam W. Effect of decompression for patients with various jaw cysts based on three-dimensional computed tomography analysis. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol*. 2017;123:445-52.

13. Anavi Y, Gal G, Miron H, Calderon S, Allon DM. Decompression of odontogenic cystic lesions: clinical long-term study of 73 cases. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2011;112:164-9.

14. Park HS, Song IS, Seo BM, Lee JH, Kim MJ. The effectiveness of decompression for patients with dentigerous cysts, keratocystic odontogenic tumors, and unicystic ameloblastoma. *J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg*. 2014;40:260-5.

15. J. Santamaria, A. M, Garcia, J. C. de Vicente, S. Landa, J. S. L@ez-Arranz: Bone regeneration after radicular cyst removal with and without guided bone regeneration. *Int. J. Oral 34axillofac. Surg*. 1998; 27: 118-120.

16. Chiapasco M, Rossi A, Motta JJ, Crescentini M: Spontaneous bone regeneration after enucleation of large mandibular cysts: a radiographic computed analysis of 27 consecutive cases. *J Oral Maxillofac Surg* 2000; 58: 942-948.

Noticias / CURSOS

• III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE CIRUGÍA BUCAL REUNIÓN DE VERANO DE SEOENE.

El próximo 27 de Junio del 2020, tendrá lugar el III Congreso de la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal – Reunión de verano de SEOENE. Que tendrá lugar en el Hotel Precise Resort, El Rompido (Huelva), un resort ubicado en un maravilloso entorno costero en el corazón de un impresionante campo de golf y rodeado por las Marismas del Río Piedras, un paisaje protegido, de gran belleza.

Organizado por la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal (AACIB) y la Sociedad Española de Odontostomatología para pacientes con necesidades especiales (SEOENE).

Se contará con la participación de un numeroso grupo de ponentes excepcionales tanto nacionales, como internacionales, aportando un gran valor científico a las jornadas de formación.

INSCRIPCIÓN SOLO A JORNADA CIENTÍFICA		
	Antes del 15/04/20	Después del 15/04/20
SOCIOS AACIB/SEOENE/SECIB	92 €	110 €
COLEGIADOS ANDALUCES	130 €	150 €
NO SOCIOS AACIB/SEOENE/SECIB	170 €	200 €

La cuota de inscripción incluye: Asistencia a las Sesiones, Documentación del Congreso, 2 Pausas Café, Almuerzo de Trabajo y Certificación de Asistencia.

INSCRIPCIÓN A JORNADA CIENTÍFICA + PROGRAMA LÚDICO		
	Antes del 15/04/20	Después del 15/04/20
SOCIOS AACIB/SEOENE/SECIB	340 €	360 €
COLEGIADOS ANDALUCES	350 €	370 €
NO SOCIOS AACIB/SEOENE/SECIB	360 €	380 €

La cuota de inscripción incluye: Asistencia a las Sesiones, Documentación del Congreso, 2 Pausas Cafés, Almuerzo de Trabajo, Certificación de Asistencia, Almuerzo Beach Club viernes, Cena Rta. La Patena viernes, Visita Doñana sábado, Cena Rta. Casa del Faro sábado, Actividades Paddlesurf domingo.

FECHAS DE ENVÍOS DE PÓSTERS

30/01/20	Apertura del plazo de recepción de abstracts (pósters).
05/05/20	Fecha tope de envío de abstracts.
Del 05/05 al 15/05/20	Toma de decisiones por parte del comité científico para la selección de abstracts.
Del 15/05 al 05/06/20	Notificación de abstracts admitidos a los autores correspondientes.

PROGRAMAS

JORNADAS CIENTÍFICAS - SÁBADO 27 JUNIO

- 08:30h-09:00h: APERTURA DE SECRETARÍA Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
- 09:00h-09:45h: SESIÓN DE PÓSTERS
- 09:45h-10:00h: INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CONGRESO
- 10:00h-11:00h: CERAMIC IMPLANTS
Ponente: Dr. Marcus Wainwright
Moderadora: Dra. Aida Gutiérrez
- 11:00h-12:00h: IMPLANTOLOGÍA EN PACIENTE CON NECESIDADES ESPECIALES
Ponente: Dr. Guillermo Mochuca
Moderadora: Dra. Aida Gutiérrez
- 12:00h-12:30h: COFFEE BREAK
- 12:30h-13:30h: MANEJO QUIRÚRGICO DEL SECTOR ANTERIOR CON IMPLANTES: ¿INMEDIATOS O DIFERIDOS?
Ponente: Dr. Jerian González
Moderador: Dra. Aida Gutiérrez
- 13:30h-14:00h: ASAMBLEA GENERAL AACIB/SEOENE
- 14:00h-15:30h: ALMUERZO DE TRABAJO
- 15:30h-16:30h: IMPLANTES PTERIGOIDES Y ZIGOMÁTICOS COMO ALTERNATIVA O COMPLEMENTO A LA REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA
Ponente: Eusebio Torres
Moderador: Dr. Antonio Batista
- 16:30h-17:30h: REGENERACIÓN ÓSEA. DE LO SENCILLO A LO COMPLICADO
Ponente: Dr. Arturo Flores
Moderador: Dr. Antonio Batista
- 17:30h-18:00h: COFFEE BREAK

PROGRAMA LÚDICO

VIERNES 26 DE JUNIO

- Horizontal Hotel Beach Club El Rompido (Almuerzo y copas)
- Cena en Restaurante La Patena

SÁBADO 27 DE JUNIO

- Visita Parque Natural Doñana (Después del almuerzo)
- Cena en Restaurante Casa del Paic

DOMINGO 28 DE JUNIO

- Actividades en la playa a mediodía/tarde
- Curso de Paddlesurf / Rutos en Kayak

• Actualización en Cirugía Bucal, en el Colegio Oficial de Dentistas de Huelva.

El próximo 20 de Marzo, tendrá lugar el curso de Actualización en Cirugía Bucal, en el Colegio Oficial de Dentistas de Huelva, impartido por los doctores Eloy Cano Díaz, la Dra María Ángeles Serrera Figallo y la Dra. Aida Gutiérrez Corrales.

Entre los temas que se abordaron durante esta jornada de formación fueron:

Por la tarde se abordarán de la mano de la Dra María Ángeles Serrera, las lesiones potencialmente malignas en Odontología, sin duda el conocimiento de éstas puede influir de manera relvante en un diagnóstico precoz y en la vida de nuestros paciente. A continuación, la Dra. Aida Gutiérrez hablará sobre las nuevas cohortes en el cáncer oral y su importancia en la prác-

tica clínica diaria.

Tras una tarde cargada de información, los asistentes podrán disfrutar de una pausa para café y compartir dudas e inquietudes.

Tras la formación teórica, los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar los conceptos en un taller práctico sobre toma de biopsias, conociendo todos los aspectos fundamentales para realizar con éxito este procedimiento quirúrgico.

Organizado por la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal y el Colegio Oficial de Dentistas de Huelva. Con la colaboración de Klockner.

PROGRAMA

16:00 - 16:45 hrs.

Lesiones potencialmente malignas en Odontología

Dra. María Ángeles Serrera Figallo

16:45 - 17:30 hrs.

Nuevas cohortes en el Cáncer oral

Dra. Aida Gutiérrez Corrales

17:00 - 17:30 hrs.

Pausa/Café

17:30 - 18:15 hrs.

Técnicas en Biopsia Oral

Dr. Eloy Cano Díaz

18:15 - 19:30 hrs.

Taller de toma de biopsias

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscripción gratuita. El alumno debe traer su propia bata clínica para acceder al taller de toma de biopsias.

En caso de asistencia es necesario reservar la plaza con antelación, aforo limitado.

[Reserva tu plaza](#)

SEDE



Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Huelva

C/ Vázquez López, 43-Bajo
21001 Huelva



Dra. María Ángeles Serrera Figallo

- Licenciada en Odontología.
- Doctora en Odontología.
- Master Propio en Medicina Bucal. Universidad de Sevilla.
- Profesora Ayudante Doctor de Cirugía Bucal y de Odontología Integrada en Pacientes Especiales, Universidad de Sevilla.

Dra. Aida Gutiérrez Corrales

- Licenciatura de Odontología. Universidad Europea de Madrid. Madrid.
- Máster Propio en Cirugía Bucal y Cirugía Bucal Avanzada. Universidad de Sevilla.
- Máster Oficial Odontología Médico-Quirúrgica e Integral. Universidad de Sevilla.
- Profesora del Máster Propio de Cirugía Bucal, Universidad de Sevilla.



Dr. Eloy Cano Díaz

- Licenciado en Odontología.
- Doctor en Odontología.
- Máster Propio en Cirugía Bucal y Cirugía Bucal Avanzada. Universidad de Sevilla.
- Profesor del Máster Propio de Cirugía Bucal y Cirugía Bucal Avanzada. Universidad de Sevilla.

• Curso: Elevación de Seno.

El próximo 13 y 14 de marzo, tendrá lugar el curso de Elevación de Seno, en el Hotel Tryp La Caleta, Cádiz, impartido por los doctores Ignacio Fernández Asián y el Dr. Rafael Flores Ruiz.

Entre los temas que se abordarán durante la jornada de formación están: de la mano del Dr. Ignacio Fernández Asián, la anatomía del maxilar posterior atrófico, posteriormente el Dr. Rafael Flores Ruiz, alternativas Terapéuticas.

Tras una formación teórica, se procederá a una formación práctica sobre elevación de seno maxilar, inserción inmediata de implantes y regeneración ósea.

Organizado por la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal y el Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz. Con la colaboración de Biohorizons Camlog.

PROGRAMA

DÍA 13, TEORÍA

16,00 - 18,00 hrs.

Anatomía del maxilar posterior atrófico. Alternativas terapéuticas

Dr. Ignacio Fernández Asián

18,00 - 18,30 hrs.

DESCANSO CAFÉ

18,30 - 20,30 hrs.

Elevación del seno maxilar: indicaciones y técnicas quirúrgicas

Dr. Rafael Flores Ruiz

DÍA 14, PRÁCTICA

10,00 - 12,00 hrs. (Limitado a 20 personas)

Taller de elevación del seno maxilar, inserción inmediata de implantes y regeneración ósea



Dr. Ignacio Fernández Asián

- Licenciatura de Odontología. Universidad Alfonso X el sabio.
- Máster Propio Cirugía Bucal Avanzada. Universidad de Sevilla.
- Máster Universitario en Ciencias Odontológicas. Universidad de Sevilla.
- Máster Universitario en Odontología Médico-Quirúrgica e Integral. Universidad de Sevilla.
- Profesor Máster Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla.
- Profesor Programa de Formación Avanzada en Implantología Estética Multidisciplinar.
- Práctica privada en Cirugía bucal e Implantología.

Dr. Rafael Flores Ruiz



- Doctor en Odontología. Universidad de Sevilla.
- Máster en Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla.
- Profesor del Máster de Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla.
- Profesor Asociado de Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla.
- Director del Programa de Formación Avanzada en Implantología Estética Multidisciplinar. AACIB-Línea IAVANTE.
- Tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla
- Práctica Privada con dedicación en exclusiva a cirugía bucal, periodoncia e implantes en Sevilla.

SEDE

Hotel Tryp La Caleta ★★★★★

Av. Amílcar Barca, 47, 11009 Cádiz

INSCRIPCIONES

Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz



Avenida Juan Carlos I, s/n

Edificio "Nuevo Estadio Ramón de Carranza" Planta 4ª
Local 35 - 11011 CÁDIZ - SPAIN
colegio@dentistascadiz.com

• VI International SCOI Congress.

La SCOI es la Sociedad Científica de Odontología Implantológica.

La sociedad está basada en un proyecto integrador orientado a la promoción del desarrollo de la implantología, para ofrecer así poder, ofrecer a los pacientes los tratamientos más predecibles y de calidad a la población.

El pasado 13 y 14 de Febrero, tuvo lugar el VI International SCOI Congress, en la ciudad de Salamanca.

En su misión de continuar con sus objetivos con la promoción del desarrollo y la divulgación del conocimiento, de las disciplinas quirúrgicas y rehabilitadoras alrededor de la Implantología oral, la SECOI organizó el

VI International Congress: Ciencia, Tecnología e Innovación, un congreso cargado de ponentes internacionales, de primer nivel.

Los alumnos del Master de Cirugía Bucal presentaron varios trabajos, por un lado, dos comunicaciones orales, una de la mano del alumno Rogelio Álvarez, titulada "Estudio descriptivo del tratamiento de superficie para implantes dentales Osseonova", la otra comunicación fue presentada por la alumna, Sara Bakali, bajo el título "Implantes inmediatos ¿Cómo podemos incrementar el éxito estético en el sector anterior?". También presentó un trabajo, en formato póster la alumna Carolina García "Efecto de la implantoplastia en la resistencia a la fractura del implante".



• Medalla al Mérito Colegial.

El pasado 8 de febrero tuvo lugar la celebración que el Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Málaga organiza anualmente, con motivo de la festividad de Santa Apolonia, patrona de los odontólogos.

La festividad de Santa Apolonia, que este año pudo contar con más de 200 asistentes, es una reunión en la que prima la confraternidad entre compañeros de profesión. La Hacienda Nadales ha sido el enclave elegido en esta ocasión para festejar el día de la patrona de los dentistas.

Tras el cóctel inicial ha tenido lugar la entrega de diplo-

mas para dar la bienvenida a los nuevos colegiados y despedir a los compañeros que ya se han jubilado, y a continuación se han otorgado las medallas.

Este año la Medalla al Mérito Colegial ha recaído en la Dra. Aída M^a Gutiérrez Corrales, vocal del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla y profesora de la Universidad de Odontología de Sevilla que ha promovido diversos cursos impartidos en el colegio malagueño. Asimismo, tanto D. Antonio Alías García, profesor de la Universidad de Almería, como D. Antonio Almanza Márquez



Noticias / CURSOS

• Curso: Actualización en Farmacología aplicada a la Odontología.

El pasado 31 de enero y 1 de febrero, tuvo lugar el curso de formación continuada: "Actualización en farmacología aplicada a la Odontología". Impartido por los doctores Guillermo Machuca Portillo, Dr. Manuel María Romero Ruiz, Dr. José Luis Gutiérrez Pérez y el Dr. Daniel Torres Lagares.

Durante el curso, los participantes recibieron la información más reciente sobre los avances en la farmacología de uso habitual en Odontología. Una revisión efectuada por los mismos por especialistas en la materia, con el objetivo de busca actualizar la visión y el manejo farmacológico de los pacientes de nuestras clínicas para llevarlos a los más actuales estándares. El curso se organizó en cuatro bloques:

Un primer bloque donde se habló sobre Analgesia y antiinflamación, resolviendo las principales dudas para el manejo del dolor y la inflamación en el campo de la cirugía bucal.

Un segundo bloque sobre Medicamentos relacionados con la osteonecrosis del maxilar. Un problema cada vez mas en auge, tanto por los clásicos bifosfonatos, como por los nuevos medicamentos antirresortivos.

Un tercer bloque sobre Antibioterapia
Un último bloque sobre Anticoagulación

El curso se pudo realizar, gracias a la inestimable colaboración y el patrocinio de la AACIB y Normon.

DR. GUILLERMO MACHUCA PORTILLO



- Médico Estomatólogo.
- Doctor en Medicina y Cirugía.
- Profesor del Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.
- Catedrático de Odontología Integrada en Pacientes con Necesidades Especiales de la Universidad de Sevilla.

DR. MANUEL MARÍA ROMERO RUIZ



- Médico Estomatólogo.
- Doctor en Medicina y Cirugía.
- Profesor del Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.
- Académico de Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.

DR. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ



- Médico Estomatólogo y Cirujano Oral y Maxilofacial.
- Director del Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.
- Profesor Titular Vinculado de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.
- Director de la UGC de Cirugía Oral y Maxilofacial de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
- Decano de la Facultad de Odontología de la Univ. de Sevilla.

DR. DANIEL TORRES LAGARES



- Odontólogo. Doctor en Odontología.
- Director del Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.
- Catedrático de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.
- Vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.



• Curso de Actualización en Cirugía Bucal. Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba.

El pasado 7 de Febrero, tuvo lugar el curso de Actualización en Cirugía Bucal, en el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba, impartido por los doctores Manuel M^º Romero Ruiz y el Dr. Daniel Torres Lagares.

Entre los temas que se abordaron durante esta jornada de formación fueron:

Por la mañana: Se estudió en detalle la anatomía y radiología aplicadas a la implantología, el enfoque clínico, junto con el diagnóstico y planificación en implantología.

Tras una mañana cargada de información, los asistentes pudieron disfrutar de una pausa para café y compartir dudas e inquietudes.

Tras la formación de la mañana, por la tarde, se continuaron afianzando conceptos como regeneración

ósea aplicada a la implantología, una pausa para café y posteriormente se pudo culminar con el manejo del postoperatorio en implantología.

Organizado por la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal y el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba. Con la colaboración de Oxein y Osteogenos.

Entre las ponencias que se podrán ir, se tratarán temas como el **socket shield**, rehabilitación estética sobre implantes, factores clave para la preservación del hueso crestal y la prevención de la periimplantitis, manejo de tejidos alrededor de implantes, criterios para el éxito en cirugía de aumento óseo, rol del tejido blando en el desarrollo de patología periimplantaria, flujo digital de trabajo, de lo tradicional a las últimas tecnologías.



• Posgrado de Anatomía Oral aplicada a la Implantología e Implantoprótesis.

El pasado 24 y 25 de Enero, comenzó el posgrado de anatomía oral aplicada a la implantología e implantoprótesis. En él, los directores del programa Jesús Ambrosiani Fernández, Eugenia Asián González, José Luis Gutiérrez Pérez y Daniel Torres Lagares, hablaron sobre el excelente programa de formación continuada que se presenta por delante a los cursillistas, donde en el que este año, ya son 12 ediciones impartidas.

Entre los temas que se abordaron en el primer módu-

lo, los participantes pudieron contar con explicaciones detalladas sobre la anatomía descriptiva orofacial, y aplicada a la implantología, posteriormente cada alumno se dispuso con la supervisión de un profesor a realizar las disecciones anatómicas de los distintos planos anatómicos de la mano del profesor Jesús Ambrosiani, también se pudo contar con la colaboración del profesor Pablo Galindo, quien hizo una excelente ponencia sobre la biología ósea.



• Sesión Solemne de Apertura del Curso Académico del 2020 Colegio Ofic. Dentistas Cádiz.

El pasado jueves 30 de Enero del 2020, tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina, a la sesión solemne de apertura del curso académico del 2020. El acto, presidido por el Excmo. Sr Presidente y la Junta de Gobierno de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.

Durante el desarrollo de la sesión, se procedió a la lectura de la memoria del curso 2019, por el Secretario General Perpetuo Ilmo.. Sr. D. Rafael Cabrera Alfonso. El discurso de apertura por el Ilmo. Sr. D. Rafael Comino Delgado, académico de número y Catedrático Honorario de Obstetricia y Ginecología, el cual versó sobre "Prevención del Cáncer".

Durante la entrega de premios concedidos por la Real Academia correspondientes al Concurso del 2019.

- Premio "Ilustre Colegio Oficial De Dentistas de Cádiz, a D. Daniel Torres Lagares (Sevilla).
- Accesit "Ilustre Colegio Oficial De Dentistas de Cádiz, a D. Carlos Javier Díaz López (Cádiz)



• Jornadas de puertas abiertas Experto de Implantología DS.

El pasado 13 de Febrero, tuvieron lugar las Jornadas de Puertas Abiertas del Experto de Implantología DS, en el Hotel Exe Sevilla Macarena.

Contamos con el Dr. Serafín Maza, el Sr. Jorge Díez y el Sr. Jesús Fernández y entre otros temas se habló sobre nuevos materiales en prótesis odontológicas mediante flujo digital de la mano del Sr. Jorge Díez.

Posteriormente sobre procedimientos de captación y diseño en flujo digital, por el Sr. Procedimientos de captación y diseño en flujo digital.

Antes del descanso, los Drs: Antonio Batista y la Dra Aída Gutiérrez, hablaron sobre el excelente programa de formación posgrado del Experto en Implantología de Denstply Sirona. Donde se ofrecer una visión global

de la formación en Implantología actual, contando con ponentes de alto nivel nacionales e internacionales.

El objetivo principal de este programa ha sido dotar a los alumnos de la competencia necesarias para llevar a cabo un correcto diagnóstico y la planificación de todo tipo de casos y a su vez, poder desarrollar las habilidades para desarrollar con éxito el tratamiento con implantes dentales.

Tras el descanso, el Dr. Serafín Maza concluyó la jornada, hablando sobre la aplicación clínica del flujo digital.

Estas jornadas han sido posibles gracias al patrocinio de Dentsply Sirona Academy. Organizado por la UDIT-CBS Cátedra de Cirugía Bucal y la Universidad de Sevilla.

Programa

14:30 hrs.

Cocktail

16:00 hrs.

Inauguración de las Jornadas

16:10 hrs.

Nuevos materiales en prótesis odontológicas mediante flujo digital
Sr. Jorge Díez

17:00 hrs.

Procedimientos de captación y diseño en flujo digital
Sr. Jesús Fernández

17:45 hrs.

Experto en Implantología Denstply Sirona
Dr. Antonio Batista y Dra. Aida Gutiérrez

18:00 hrs.

Café

18:30 hrs.

Aplicación clínica del flujo digital
Dr. Serafín Maza

20:00 hrs.

Clausura

Ponentes (Equipo conjunto de trabajo)

DR. SERAFÍN MAZA

- Licenciado en Odontología (Universidad de Sevilla)
- Doctorando en prostodoncia (Universidad de Sevilla)
- Advanced Periodontal/Implant Surgery: A Practical Training Course (Universidad de Michigan)
- Posgrado Académico en Prótesis Dental (Academia de las Ciencias Médicas de Barcelona)
- Posgrado en Estética y Cosmética Dental (Academia de las Ciencias Médicas de Barcelona)
- Certificado Universitario en Endodoncia Avanzada (Universidad Complutense de Madrid)
- Experto en Endodoncia y Odontología Restauradora (Valencia)



- Miembro de **SEPES** (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética), **COI** (International Congress of Oral Implantologists), **SCOI** (Sociedad Científica de Odontología Implantológica), **SOCE** (Sociedad Española de Odontología Digital) y **Denstply Sirona Academy**
- Dictante nacional especializado en flujo digital
- Practica privada exclusiva en prostodoncia y estética dental
- Experto en soluciones Cad-cam y técnicas Cerec digital
- Larga experiencia en soluciones digitales prostodóncicas aplicadas (mas de 5.000 casos)
- Usuario Premium Europeo del sistema de Pilares customizados Atlantis de Denstply Sirona

SR. JORGE DÍEZ

- Técnico en prótesis dental
- Miembro de **SEPES** (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética) y **ACADEN** (Asociación Andaluza para la divulgación de la prótesis dental)
- Director de laboratorio de prótesis dental Díez entre 1995 y 2017
- Experto en diseño digital con el sistema Cerec - Dentsply Sirona
- Dedicación exclusiva a la elaboración de soluciones digitales prostodóncicas
- Amplia experiencia en mas de 3.000 casos resueltos digitalmente
- Especialista en terminación de casos estéticos con aplicación de porcelana sobre estructuras digitales



SR. JESÚS FERNÁNDEZ

- Higienista dental
- Técnico en Prótesis Dental
- Miembro de **SEPES** (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética), **SEPA** (Sociedad Española de Periodoncia e Implantología) y **HIDES** (Asociación de Higienistas de Andalucía)
- "Materials in oral health", Universidad de Hong Kong, 2018
- Experto en diseño digital con el sistema Cerec - Denstply Sirona
- Especialista en captaciones digitales
- Dedicación exclusiva a la captación, diseño y elaboración de soluciones digitales prostodóncicas
- Experiencia en mas de 2.000 casos resueltos digitalmente



Patrocinado por: Organiza:





**biohorizons
camlog**



**Dentsply
Sirona**

oxteia



Osteògenos
Dental Surgical Devices

Ancladén



NORMON
DENTAL



Klockner®



inibsa
DENTAL

Normas de publicación

NORMAS DE PUBLICACIÓN

La Revista Andaluza de Cirugía Bucal publica artículos científicos relacionados con el campo de la Cirugía Bucal que sean de interés para cualquier odontoestomatólogo que desarrolle dicha área en su práctica profesional.

El Comité Editorial seguirá de forma estricta las directrices expuestas a continuación, siguiendo la normativa de Vancouver. Los artículos que no se sujeten a ellas serán devueltos para corrección, de forma previa a la valoración de su publicación.

Todos los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, no publicados ni enviados a otra publicación, siendo el autor el único responsable de las afirmaciones sostenidas en él.

Todos aquellos autores que quieran mandar su artículo científico podrán hacerlo enviándolo vía e-mail a **revista@aacib.es** con copia a **danieltl@us.es**, enviando un archivo con el texto del manuscrito en formato Word para PC, y las imágenes en archivos distintos en formato TIFF o JPG.

TIPOS DE ARTÍCULOS

1. Artículos originales, que aporten nuevos datos clínicos o de investigación básica relacionada con la Cirugía Bucal.

2. Revisiones y puesta al día que supongan la actualización, desde un punto de vista crítico científico y objetivo, de un tema concreto. No existe limitación en el número de citas bibliográficas, si bien se recomienda al autor o autores, que sean las mínimas posibles, así como que sean pertinentes y actualizadas. Además, dado el interés práctico de esta publicación, el texto debe estar apoyado en un adecuado material iconográfico.

3. Resúmenes comentados de literatura actual. Serán encargados por la Revista a personas cualificadas e interesadas en realizar una colaboración continuada.

4. Casos clínicos, relacionados con problemas poco frecuentes o que aporten nuevos conceptos terapéuticos, serán publicados en esta sección. Deben contener documentación clínica e iconográfica completa pre, per y postoperatoria, y del seguimiento ulterior, así como explicar de forma clara el tratamiento realizado. El texto debe ser conciso y las citas bibliográficas limitarse a las estrictamente necesarias. Resultarán especialmente interesantes secuencias fotográficas de tratamientos multidisciplinarios de casos complejos o técnicas quirúrgicas.

5. Cartas al director que ofrezcan comentarios o críticas constructivas sobre artículos previamente publicados u otros temas de interés para el lector. Deben tener una extensión máxima de dos folios tamaño DIN-A4 escritos a doble espacio, centradas en un tema específico y estar firmadas. En caso de que se viertan comentarios sobre un artículo publicado en esta revista, el autor del mismo dispondrá de la oportunidad de respuesta. La pertinencia de su publicación será valorada por el Comité Editorial.

6. Otros, se podrán publicar, con un formato independiente,

documentos elaborados por Comités de Expertos o Corporaciones de reconocido prestigio que hayan sido aceptados por el Comité Editorial.

AUTORES

Únicamente serán considerados como autores aquellos individuos que hayan contribuido significativamente en el desarrollo del artículo y que, en calidad de tales, puedan tomar pública responsabilidad de su contenido. Su número, no será, salvo en casos excepcionales, superior a 7. A las personas que hayan contribuido en menor medida les será agradecida su colaboración en el apartado de agradecimientos. Todos los autores deben firmar la carta de remisión que acompañe el artículo, como evidencia de la aprobación de su contenido y aceptación íntegra de las normas de publicación.

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

El documento debe ser enviado, en formato Word para PC sobre una página de tamaño DIN-A4 blanco, a 1,5 espacio de interlineado, con márgenes mínimos de 25 mm y con hojas numeradas. Asimismo, se enviarán las imágenes en formato JPG o TIFF en archivos independientes al documento, nunca insertadas en el texto.

Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:

Primera página

Debe contener:

1. El título del artículo y un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en español.
2. El nombre y dos apellidos del autor o autores, con el (los) grado(s) académico(s) más alto(s) y la afiliación a una institución si así correspondiera.
3. El nombre del departamento(s) e institución(es) responsables.
4. La negación de responsabilidad, si procede.
5. El nombre del autor responsable de la correspondencia sobre el documento.
6. La(s) fuente(s) de apoyo en forma de subvenciones, equipo o fármacos y el conflicto de intereses, si hubiera lugar.

Resumen

Una página independiente debe contener, el título del artículo y el nombre de la revista, un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior a 200 palabras, y el listado de palabras clave en español. Las palabras clave serán entre 3 y 10 términos o frases cortas de la lista del «Medical Subject Headings (MeSH)» del «Index Medicus».

Los trabajos de investigación originales contendrán resúmenes estructurados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artículo. Su extensión no debe ser superior a 200 palabras y estará estructurado en los siguientes apartados: introducción (fundamento y objetivo), material y metodología, resultados y conclusiones.

Introducción

Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando las citas bibliográficas estrictamente necesarias. No se debe realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del trabajo que se publica.

Material y metodología

Será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Métodos previamente publicados como índices o técnicas deben describirse solo brevemente y aportar las correspondientes citas, excepto que se hayan realizado modificaciones en los mismos. Los métodos estadísticos empleados deben ser adecuadamente descritos, y los datos presentados de la forma menos elaborada posible, de manera que el lector con conocimientos pueda verificar los resultados y realizar un análisis crítico. En la medida de lo posible las variables elegidas deberán ser cuantitativas, las pruebas de significación deberán presentar el grado de significación y si está indicado la intensidad de la relación observada y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas de su correspondiente intervalo de confianza. Se especificarán los criterios de selección de individuos, técnica de muestreo y tamaño muestral, empleo de aleatorización y técnicas de enmascaramiento. En los ensayos clínicos y estudios longitudinales, los individuos que abandonan los estudios deberán ser registrados y comunicados, indicando las causas de las pérdidas. Se especificarán los programas informáticos empleados y se definirán los términos estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.

En los artículos sobre ensayos clínicos con seres humanos y estudios experimentales con animales, deberá confirmarse que el protocolo ha sido aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal del centro en que se llevó a cabo el estudio, así como que el estudio ha seguido los principios de la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983.

Los artículos de revisión deben incluir la descripción de los métodos utilizados para localizar, seleccionar y resumir los datos.

Resultados

Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas o figuras, no debiendo repetirse en ellas los mismos datos. Se procurará resaltar las observaciones importantes.

Discusión

Resumirá los hallazgos relacionando las propias observaciones con otros estudios de interés y señalando las aportaciones y limitaciones de unos y otros. De ella se extraerán las oportunas conclusiones, evitando escrupulosamente afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo.

Agradecimientos

Únicamente se agradecerá, con un estilo sencillo, su colaboración a personas que hayan hecho contribuciones sustan-

ciales al estudio, debiendo disponer el autor de su consentimiento por escrito.

Bibliografía

Las citas bibliográficas deben ser las mínimas necesarias. Como norma, no deben superar el número de 30, excepto en los trabajos de revisión, en los cuales el número será libre, recomendando, no obstante, a los autores, que limiten el mismo por criterios de pertinencia y actualidad. Las citas serán numeradas correlativamente en el texto, tablas y leyendas de las figuras, según el orden de aparición, siendo identificadas por números arábigos en superíndice.

Se recomienda seguir el estilo de los ejemplos siguientes, que está basado en el Método Vancouver, «Samples of Formatted References for Authors of Journal Articles», que se puede consultar en la siguiente web: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Se emplearán los nombres abreviados de las revistas de acuerdo al «Abridged Index Medicus Journal Titles», basado en el «Index Medicus». Puede consultarlo aquí (<https://www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html>)

Es recomendable evitar el uso de resúmenes como referencias, y no se aceptará el uso de «observaciones no publicadas» y «comunicaciones personales». Se mencionarán todos los autores si son menos de seis, o los tres primeros y et al, cuando son siete o más.

Tablas

Deben presentarse en hojas independientes numeradas según su orden de aparición en el texto con números arábigos. Se emplearán para clarificar puntos importantes, no aceptándose la repetición de datos bajo la forma de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen deberán explicar el contenido de las mismas.

Figuras

Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas o dibujos, deberán clarificar de forma importante el texto y su número estará reducido al mínimo necesario.

Se les asignará un número arábigo, según el orden de aparición en el texto, siendo identificadas por el término «Figura», seguido del correspondiente guarismo.

Los pies o leyendas de cada una deben ir indicados y numerados.

Las imágenes deben enviarse, preferentemente en formato JPG o TIFF, con una resolución de 300 píxeles por pulgada, nunca pegadas en el documento de texto.

AUTORIZACIONES EXPRESAS DE LOS AUTORES A RACIB

Los autores que envíen sus artículos a RACIB para su publicación, autorizan expresamente a que la revista reproduzca el artículo en la página web de la que RACIB es titular.